



ORGANISATION EUROPEENNE  
ET MEDITERRANEENNE  
POUR LA PROTECTION DES PLANTES

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN  
PLANT PROTECTION  
ORGANIZATION

# OEPP

## Service d'Information

No. 6 PARIS, 2026-06

### Général

---

2026/136 Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP

### Ravageurs

---

2026/137 Premier signalement d'*Agrilus planipennis* en Hongrie  
2026/138 Premier signalement d'*Aceria litchii* en Israël  
2026/139 Premier signalement de *Cryphalus morivorus* en Slovaquie et dans la région OEPP  
2026/140 Premier signalement de *Baliothrips sunae* aux Pays-Bas  
2026/141 Incursion d'*Erthesina fullo* (Thunberg, 1783) (Hemiptera : Pentatomidae) en Italie  
2026/142 Nouveaux signalements d'organismes nuisibles dans le sud des États-Unis  
2026/143 *Prionus imbricornis* (Coleoptera : Cerambycidae), ravageur émergent du myrtillier arbustif aux États-Unis

### Maladies

---

2026/144 *Potyvirus capsivenamaculae*: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP  
2026/145 Premier signalement de la race tropicale 4 de *Fusarium oxysporum* f. sp. *ubense* au Népal  
2026/146 Premier signalement de *Lecanosticta acicola* en Finlande  
2026/147 Présence de la tache bactérienne de la tomate et du poivron en Inde  
2026/148 Premier signalement du tomato brown rugose fruit virus en Écosse (Royaume-Uni)  
2026/149 Mise à jour sur la situation du citrus yellow vein clearing virus en Espagne  
2026/150 Nouveau signalement de *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* en Espagne  
2026/151 Nouveau signalement de *Clavibacter sepedonicus* en Italie (Calabrie)  
2026/152 Éradication du tomato leaf curl New Delhi virus en Slovaquie  
2026/153 Vecteurs potentiels du grapevine red blotch virus

### Agents de lutte biologique

---

2026/154 Étude sur le potentiel de la lutte biologique contre *Parthenium hysterophorus* à Oman  
2026/155 Suivi post-lâcher d'agents de lutte biologique contre *Alliaria petiolata* au Canada  
2026/156 Introduction accidentelle d'*Ophraella communa* dans la région OEPP

### Plantes envahissantes

---

2026/157 *Physalis longifolia* dans la région OEPP : addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP  
2026/158 Établissement de priorités pour les espèces de plantes de la Liste d'Alerte de l'OEPP  
2026/159 *Ambrosia psilostachya* et *Xanthium spinosum* : addition à la Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP  
2026/160 Premier signalement de *Furcraea hexapetala* au Maroc

## 2026/136 Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP

En parcourant la littérature, le Secrétariat de l'OEPP a extrait les nouvelles informations suivantes sur des organismes de quarantaine et des organismes nuisibles de la Liste d'Alerte de l'OEPP (ou précédemment listés). La situation de l'organisme concerné est indiquée en gras, dans les termes de la NIMP no. 8.

- **Nouveaux signalements**

*Drosophila suzukii* (Diptera : Drosophilidae - Liste A2 de l'OEPP) est signalé pour la première fois en Colombie. Ce ravageur a été détecté dans plusieurs zones des départements d'Antioquia, de Santander et de Boyacá, uniquement sur fraisier. Des prospections officielles sont en cours pour déterminer la répartition du ravageur dans le pays (CIPV, 2026).

Le statut phytosanitaire de *Drosophila suzukii* en Colombie est officiellement déclaré ainsi : **Présent, non largement disséminé et faisant l'objet d'une lutte officielle.**

Le squash vein yellowing virus (*Ipomovirus cucurbitavenaflavi*, SqVYV - Organisme de quarantaine de l'UE, 2019/2072 Annexe II A) est signalé pour la première fois en Inde. Il a été détecté à Varanasi (Uttar Pradesh) sur des gourdes (*Lagenaria siceraria*) et concombres (*Cucumis sativus*) présentant des symptômes au cours des saisons de végétation 2022 et 2023. Le pathogène avait d'abord été identifié par séquençage à haut débit (HTS) et ce résultat a ensuite été validé par RT-PCR. Il s'agit de la première découverte du SqVYV en Inde et du premier signalement de *L. siceraria* en tant qu'hôte (Krishnan *et al.*, 2026). **Présent, répartition limitée.**

Le tomato spotted wilt virus (*Orthotospovirus tomatomaculæ*, TSWV - Liste A2 de l'OEPP) est signalé pour la première fois au Mali. Il a été détecté sur des plants symptomatiques d'arachide (*Arachis hypogaea*) et de tomate (*Solanum lycopersicum*) à la station de recherches de Sotuba (district de Bamako), au cours de la saison de végétation 2024 (Bagayoko *et al.*, 2026). L'organisme nuisible a été identifié par des tests moléculaires. **Présent, répartition limitée.**

*Meloidogyne enterolobii* (Liste A2 de l'OEPP) est signalé pour la première fois au Sri Lanka. Le nématode a été détecté sur goyavier (*Psidium guajava*), piment (*Capsicum spp.*) et tomate (*Solanum lycopersicum*) dans les provinces du Nord-Ouest, du Centre et de l'Ouest. Le nématode a été identifié par des tests moléculaires (Rajapakse *et al.*, 2026). **Présent, largement disséminé.**

- **Signalement détaillé**

En Indonésie, le citrus tristeza virus (*Closterovirus tristeza* - CTV - Liste A2 de l'OEPP) est présent dans la province de Bali (Nusa Tenggara) (Nurulita *et al.*, 2026).

Au Canada, le nématode à kyste de la pomme de terre *Globodera rostochiensis* (Liste A2 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois au Manitoba. Il a été détecté dans une seule parcelle (de 72 hectares) sur une exploitation agricole dans le sud-ouest du Manitoba. Des mesures officielles sont appliquées (CIPV, 2026).

Le statut phytosanitaire de *Globodera rostochiensis* au Canada est officiellement déclaré ainsi : **Présent, non largement disséminé et faisant l'objet d'une lutte officielle.**

Au Brésil, le Huanglongbing a été signalé pour la première fois dans l'état du Rio Grande do Sul début juin 2026 dans un verger familial de la municipalité de Palmitinho, dans la région

du Médio Alto Uruguai, près de la frontière avec l'état de Santa Catarina, dans le cadre de prospections officielles. Des mesures officielles ont été appliquées et le foyer a été déclaré éradiqué le 11 juin (Governo do Estado Rio Grande do Sul, 2026-06-09 et 2026-06-11). L'introduction était probablement liée au mouvement illégal de plantules infestées. Le communiqué de presse ne mentionne pas l'espèce de *Liberibacter* identifiée. '*Candidatus Liberibacter americanus*' (Liste A1 de l'OEPP) et '*Candidatus Liberibacter asiaticus*' (Liste A1 de l'OEPP) sont tous deux présents dans l'état de Santa Catarina. Des prospections supplémentaires seront menées dans un rayon de 2,4 km autour du foyer. **Éradiqué dans l'état du Rio Grande do Sul.**

Au Ghana, *Diaphorina citri* (Hemiptera : Psyllidae - Liste A1 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en 2022 dans la région de la Volta sur des *Murraya paniculata* cultivés à des fins ornementales (SI OEPP 2023/161). Ninsin et al. (2025) signalent la présence de *D. citri* dans les régions suivantes sur orangers (*Citrus x aurantium* var. *sinensis*) et citronniers (*C. x limon*) : Volta, Eastern et Greater Accra.

En Inde, *Liriomyza trifolii* (Diptera : Agromyzidae - Liste A2 de l'OEPP) cause des dégâts sur calebasse (*Lagenaria siceraria*) au Rajasthan (Kumawat et al., 2026).

À Taïwan, on connaissait la présence de l'agent causal de la maladie 'laurel wilt', *Harringtonia lauricola* (Liste d'Alerte de l'OEPP), et de son principal vecteur *Xyleborus glabratus* (Coleoptera : Curculionidae : Scolytinae - Liste d'Alerte de l'OEPP). Par contre, la maladie elle-même n'avait pas été documentée dans le pays. En 2025, des prospections ont été menées dans des vergers commerciaux d'avocatier (*Persea americana*) présentant des arbres symptomatiques. Des tests morphologiques et moléculaires ont confirmé la présence de la maladie 'laurel wilt' (Gazis et al., 2026).

En Belgique, seuls 29 spécimens de *Monochamus galloprovincialis* (Coleoptera : Cerambycidae - vecteur de *Bursaphelenchus xylophilus*) ont été capturés entre 2013 et 2022, avec 45 à 95 pièges déployés chaque année. Sur la base de ces données et d'un modèle de répartition des espèces, Grégoire et al. (2026) concluent que la probabilité que *Monochamus galloprovincialis* soit établi en Belgique est faible. Sur la base du génotypage, ils concluent qu'au moins certains des adultes capturés en Belgique provenaient d'autres pays.

En Chine, les virus suivants ont été signalés pour la première fois sur des tomates (*Solanum lycopersicum*) présentant des symptômes dans la province du Xinjiang : tomato spotted wilt virus (*Orthotospovirus tomatomaculae*, TSWV - Liste A2 de l'OEPP), tomato mottle mosaic virus (*Tobamovirus maculatessellati*, ToMMV - précédemment sur la Liste d'Alerte de l'OEPP), tomato brown rugose fruit virus (*Tobamovirus fructirugosum*, ToBRFV - Liste A2 de l'OEPP), tomato ringspot nepovirus (*Nepovirus lycopersici*, ToRSV - Liste A2 de l'OEPP), tomato black ring virus (*Nepovirus nigranuli*, TBRV - ORNQ de l'UE) and tomato chlorosis virus (*Crinivirus tomatichlorosis*, ToCV - Liste A2 de l'OEPP). Ils ont été identifiés par des tests moléculaires (Cao et al., 2026).

- **Nouvelles plantes-hôtes**

Le nématode à galles *Meloidogyne vitis* (Nematoda : Meloidogynidae) a été décrit récemment en Chine (province du Yunnan) sur vigne (*Vitis vinifera*) (SI OEPP 2021/027). Yang et al. (2026) ont identifié une nouvelle plante-hôte : *M. vitis* a été trouvé causer des dégâts sur mûrier blanc (*Morus alba*) dans la province du Yunnan.

La sauge sclarée (*Salvia sclarea*) est signalée pour la première fois en tant que plante-hôte d'*Helicoverpa armigera* (Lepidoptera : Noctuidae - Liste A2 de l'OEPP) dans des essais au champ réalisés entre mars et mai 2025 dans l'Uttar Pradesh, en Inde (Singh *et al.*, 2026).

Dans la province du Yunnan (Chine), le tomato zonate spot virus (*Orthotospovirus tomatozonae*, TZSV) a été signalé sur des kiwis (*Actinidia chinensis*) présentant des symptômes. Le TZSV a été identifié par des tests moléculaires ; il a toutefois été détecté dans un seul échantillon symptomatique, et des tests de pouvoir pathogène sont donc nécessaires (Yin *et al.*, 2026).

En Virginia (États-Unis), *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* (Liste A2 de l'OEPP) a été détecté en septembre 2025 sur des sumacs vénéneux (*Toxicodendron radicans*) présentant des symptômes de brûlure foliaire, en limite d'un vignoble comportant des plantes trouvées infectées par *X. fastidiosa* subsp. *multiplex*. L'organisme nuisible a été identifié par des tests moléculaires (Yang *et al.*, 2026).

Au Pérou, *Euplatypus parallelus* (Coleoptera: Platypodinae - précédemment sur la Liste d'Alerte de l'OEPP) et *Coptoborus ricini* (Coleoptera: Scolytinae) ont été signalés causer la mort de jeunes cacaoyers (*Theobroma cacao*). Les ravageurs ont été identifiés par des tests morphologiques et moléculaires (Rojas-Vargas *et al.*, 2026).

**Sources:** Bagayoko I, Berete B, Tiendrebeogo A (2026) First report of tomato spotted wilt virus infecting peanut and tomato in Mali: molecular evidence and pathogenicity. *Journal of Advances in Microbiology* 26(5), 182-190.

Cao XP, Han S, Zhou TT, Feng J, Abudousaimaiti T, Zhang FQ, Cao LX, Gu QS, Yushanjiang M (2026) Detection and analysis of virus and its infection types on facility-cultivated tomatoes in southern Xinjiang. *Acta Phytopathologica Sinica* 56(2) 197-206 <http://zwblxb.magtech.com.cn/EN/10.13926/j.cnki.apps.001372>

Gazis R, Díaz-Valderrama JR, Liang YP, Liu TY (2026) First report of laurel wilt caused by *Harringtonia lauricola* on Avocado in Taiwan. *Plant Disease* 110(2), 555. <https://doi.org/10.1094/PDIS-10-25-2035-PDN>

Governo do Estado Rio Grande do Sul  
-Press release. (2026-06-09) Doença que afeta citros, greening é confirmada em plantas no Rio Grande do Sul. <https://estado.rs.gov.br/doenca-que-afeta-citros-greening-e-confirmada-em-plantas-no-rio-grande-do-sul>  
-Press release. (2026-06-11) Governo do Estado erradica foco de greening e amplia monitoramento em Palmitinho. <https://estado.rs.gov.br/governo-do-estado-erradica-foco-de-greening-e-amplia-monitoramento-em-palmitinho>

Grégoire JC, Artois J, Claude J, Gilbert M, Morand S, Roux G, San Martin G, Avtzis D, Berkvens N, Bonte J, Casteels H (2026) Introduced or established? Convergent evidence indicates imported pine wood nematode vectors occupy gaps in native distribution. *Journal of pest science* 99(2), 67. <https://doi.org/10.1007/s10340-026-02025-1>

IPPC website. Official Pest Reports - Canada (2026-06-17): Confirmation of golden nematode (*Globodera rostochiensis*) in the province of Manitoba / Confirmation du nématode doré (*Globodera rostochiensis*) dans la province du Manitoba. <https://www.ippc.int/fr/countries/canada/pestreports/2026/06/confirmation-of-golden-nematode-globodera-rostochiensis-in-the-province-of-manitoba-confirmation-du-nematode-dore-globodera-rostochiensis-dans-la-province-du-manitoba/>

IPPC website. Official Pest Reports - Colombia (2026-05-29): Reporte de plagas. *Drosophila suzukii* Matsumura. <https://www.ippc.int/en/countries/venezuela->

[bolivarian-republic-of/pestreports/2023/01/phytosanitary-emergency-for-presence-of-foc-r4t/](https://doi.org/10.1007/s12222-026-10000-0)

Krishnan N, Sidharthan VK, Kumar RV, Pandey S, Karmakar P, Chaubey T, Balasubramanian V, Selvarajan R (2026) High-throughput virome profiling reveals squash vein yellowing virus in bottle gourd and cucumber in India. *3 Biotech* **16**(6), 249.

Kumawat K, Kumawat MM, Dangi NL, Ram D, Sharma RK (2026) Population dynamics of major insect pests in bottle gourd. *Entomon* **51**(1), 53-58.  
<https://doi.org/10.33307/entomon.v51i1.161>

Ninsin KD, Billah MK, Boateng BA, Osei-Owusu J, Ablormeti FK, Opuni-Basoa S, Dofuor AK, Edusei G, Baleba SB, Aidoo OF (2025) Morphometric characterization of invasive *Diaphorina citri* infesting citrus and orange jasmine in Ghana. *Cogent Food & Agriculture* **11**(1), 2522985. <https://doi.org/10.1080/23311932.2025.2522985>

Nurulita S, Undaharta NK, Mutaqin KH, Zakeel MC, Hidayat SH (2026) Incidence, molecular detection, and genetic characterization of citrus tristeza virus: a case study from Bali, Indonesia. *Tropical Plant Pathology* **51**(1), 31.

Rajapakse RV, Bandara KG, Hettiarachchi CM (2026) Molecular identification of plant pathogenic *Meloidogyne* species in Sri Lanka. *Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka* **54**(1), 87-100 <http://dx.doi.org/10.4038/jnsfsr.v54i1.12838>

Rojas-Vargas J, Hernández-May MA, Oliva-Cruz M, Huaman-Pilco AF (2026) *Coptoborus ricini* and *Euplatypus parallelus* (Curculionidae: Scolytinae, Platypodinae) associated with cacao plant mortality in Amazonas, Peru. *Phytoparasitica* **54**(3), 60

Singh P, Singh S, Somjith PK, Kedar SC (2026) Occurrence of *Helicoverpa armigera* (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae) on clary sage (*Salvia sclarea* L.) in Northern India. *Journal of Entomology Research* **50**(2) 1-4  
<https://doi.org/10.65521/jer.v50.i2.2026.72>

Sultonazirova S, Akhmadaliev BJ, Gulomova IB, Makhkamov M, Eshonkulov OD, Babakhanova DB, Inkhonova A (2026) Molecular characterization of the Tomato chlorosis virus (ToCV) in Uzbekistan. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*. **58**(2), 527-536 <http://doi.org/10.54910/sabrao2026.58.2.4>

Yang Y, Yu X, Tang D, Xu W, Zhang Z, Wang P, Yuan S (2026) *Meloidogyne vitis* infecting mulberry (*Morus alba* L.) in Yunnan, China: morphology, molecular identification, and pathogenicity. *BMC Plant Biology* (early view)  
<https://doi.org/10.1186/s12870-026-08819-w> .

Yang J, Lorv JS, Bragard C, Vinatzer B (2026) First report of leaf scorch of Poison ivy (*Toxicodendron radicans*) caused by *Xylella fastidiosa* in Virginia. *Plant Disease* (early view) <https://doi.org/10.1094/PDIS-05-26-0895-PDN>

Yin Y, Chen X, Li L, Dong R, Lin T, Ding M, Li T (2026) First report of tomato zonate spot virus infecting *Actinidia chinensis* Planch. in China. *Plant Disease* (early view)  
<https://doi.org/10.1094/PDIS-02-26-0366-PDN>

**Mots clés supplémentaires :** nouveau signalement, signalement détaillé, nouvelle plantes-hôtes

**Codes informatiques :** COPBRI, CTV000, DIAACI, DROSSU, HELIAR, HETDRO, LIBEAS, LIRITR, MELGMY, MELGVI, MONCGA, PLTPPA, RAFFLA, SQVYVX, TBRV00, TOBRFV, TOCV00, TOMMV0, TORSV0, TSWV00, TZSV00, XYLBGR, XYLEFA BE, BR, CA, CN, CN, CO, GH, ID, IN, IN, LK, ML, TW, US

**2026/137 Premier signalement d'*Agrilus planipennis* en Hongrie**

L'ONPV de Hongrie a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP du premier signalement de l'agrile du frêne *Agrilus planipennis* (Coleoptera : Buprestidae - Liste A2 de l'OEPP) sur son territoire. Il s'agit du premier signalement de ce ravageur dans l'Union européenne. Dans la région OEPP, *A. planipennis* a été signalé pour la première fois dans la partie européenne de la Fédération de Russie en 2007 (SI OEPP 2007/067), en Ukraine en 2019 (SI 2019/202) et au Bélarus en 2025 (SI 2025/208).

En Hongrie, un spécimen a été capturé le 2026-06-09 dans un piège à phéromones mis en place par l'Institut de recherche forestière (ERTI) de l'Université de Sopron à Beregsurány (région d'Észak-Alföld, dans l'est de la Hongrie). L'identification du ravageur a été réalisée par un test moléculaire (basé sur la PCR) par le laboratoire national de référence.

La surveillance a été intensifiée dans la zone touchée, y compris par le déploiement de pièges supplémentaires et des prospections ciblées sur les plantes-hôtes (*Fraxinus* spp.). Des observations préliminaires aux environs du piège ont détecté sur des frênes des symptômes semblables à ceux d'une infestation par *A. planipennis*. Des prospections de délimitation sont en cours. Une zone délimitée a été établie autour du site de détection et s'étend jusqu'à la frontière avec l'Ukraine, et une partie de la zone tampon et de la zone de prospection se trouvent sur le territoire ukrainien. Une coordination avec l'ONPV ukrainienne est mise en place. Le plan d'urgence national contre *A. planipennis* est mis en œuvre en Hongrie.

Le statut phytosanitaire d'*Agrilus planipennis* en Hongrie est officiellement déclaré ainsi : **Transitoire, donnant lieu à une action phytosanitaire, sous surveillance.**

Source: ONPV de Hongrie (2026-06).

Mot clé supplémentaire : nouveau signalement

Code informatique : AGRLLP, HU

**2026/138 Premier signalement d'*Aceria litchii* en Israël**

L'ONPV d'Israël a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP du premier signalement d'*Aceria litchii* (Acari : Eriophyidae - 'lychee erinose mite'), sur son territoire. Il s'agit d'un organisme de quarantaine pour Israël.

Au printemps 2025, des symptômes suspects ont été observés sur *Litchi chinensis* dans un verger commercial situé dans une petite zone proche de la frontière avec le Liban. Des échantillons de matériel végétal infesté ont été prélevés et l'organisme nuisible a été identifié comme étant *Aceria litchii* par des tests morphologiques et moléculaires au laboratoire officiel. Il s'agit de la première découverte de cet organisme nuisible en Israël. La filière d'entrée n'est pas connue, mais on soupçonne l'importation illégale de matériel de multiplication interdit.

Une prospection nationale a été menée et a confirmé que la répartition de l'acarien est limitée à des parcelles commerciales de litchis situées dans une zone restreinte proche de la frontière libanaise. En parallèle, des mesures d'éradication sont mises en œuvre dans la zone du foyer. Les arbres infestés sont élagués pour éliminer toutes les feuilles et traités par des pulvérisations de soufre. Les branches et rameaux infestés élagués sont détruits.

Le statut phytosanitaire d'*Aceria litchii* en Israël est officiellement déclaré ainsi : **Présent, répartition limitée et en cours d'éradication.**

*Aceria litchii* est l'un des organismes nuisibles les plus importants du litchi. Natif d'Asie, il a été signalé en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Thaïlande, en Chine et à Taiwan, ainsi qu'à Hawaï et en Australie. En 2010, il a été signalé pour la première fois au Brésil et il s'est disséminé à toutes les principales zones de production de litchis. En 2018, il a été trouvé pour la première fois en Florida (États-Unis), où il est en cours d'éradication. Giordano *et al.* (2024) ont fait un premier signalement dans la région OEPP, en Italie. *A. litchii* a été identifié à l'automne 2023 dans une parcelle de litchis présentant des symptômes dans le nord de la région Sicilia. Des symptômes similaires mais d'une intensité moindre avaient été observés sur les feuilles des lychees de cette parcelle au cours de la décennie précédente, mais ils n'avaient pas été jugés poser un problème phytosanitaire.

**Source:** ONPV d'Israël (2026-06).

Giordano T, Lamendola M, Mezzano M, Scuderi D, Gugliuzza G, Tsolakis H (2024) Invasion of the erinose mite *Aceria litchii* (Eriophyoidea, Eriophyidae) in Europe. *International Journal of Acarology* 50(4), 392-394.

Revynti AM, Crane JH, Wasielewski J, Kendra PE, Carillo D (2021) The Lychee Erinose Mite (Keifer) (Acari: Eriophyidae). ENY2073, Entomology and Nematology Department, UF/IFAS Extension. <https://doi.org/10.32473/edis-IN1347-2022>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : ERPHLI, IL, IT

### 2026/139 Premier signalement de *Cryphalus morivorus* en Slovaquie et dans la région OEPP

*Cryphalus morivorus* (Coleoptera : Curculionidae : Scolytinae, organisme de quarantaine de l'UE en tant que 'Scolytinae non européens') est signalé pour la première fois dans la région OEPP. *C. morivorus* a été décrit en Chine et est principalement associé à des mûriers (*Morus alba* et *M. australis*). Il est présent en Chine, à Taiwan et en République de Corée.

*C. morivorus* a été détectée en mai 2025 au cours d'un échantillonnage en plein champ à Piešťany (région de Trnava, ouest de la Slovaquie). Des adultes ont été prélevés directement sur des rameaux infestés de mûrier blanc (*M. alba*) qui présentaient des symptômes de dépérissement des rameaux. L'examen de matériel d'herbier conservé (rameaux de *Morus*), collecté entre 2016 et 2024 dans 34 localités, a montré que le ravageur était déjà présent dans le pays en 2022. Au total, *C. morivorus* a été détecté dans quatre localités (Bratislava, Devín, Lučenec et Piešťany) dans l'ouest et le sud du pays.

L'identité du ravageur a été confirmée par des tests morphologiques et moléculaires. Les auteurs notent que *C. morivorus* semble actuellement attaquer seulement des rameaux fins de mûrier et il n'a pas encore été associé à des champignons pathogènes dans les conditions européennes.

L'ONPV de Slovaquie a récemment mené une surveillance officielle. En avril 2026, *C. morivorus* a été détecté dans des branches de *Morus* sp. collectées dans un espace vert public à Devín (commune de Bratislava). L'identité du ravageur a été confirmée par le laboratoire de référence de l'UE pour les insectes et les acariens.

Le statut phytosanitaire de *Cryphalus morivorus* en Slovaquie est officiellement déclaré ainsi : **Transitoire**.

**Source:** ONPV de Slovaquie (2026-06).

Pastirčák M, Barta M, Vakula J, Knížek M, Pastirčáková K (2026) First European record of the East Asian bark beetle *Cryphalus morivorus* (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) on white mulberry (*Morus alba*), with evidence of establishment in Slovakia. *Forestry: An International Journal of Forest Research* 99(3), cpag037. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpag037>

**Photos :** Les auteurs ont aimablement fourni des photos, disponibles dans EPPO Global Database *Cryphalus morivorus*. <https://gd.eppo.int/taxon/CRYHMO/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : CRYHMO, SK

### **2026/140 Premier signalement de *Baliothrips sunae* aux Pays-Bas**

L'ONPV des Pays-Bas a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP de la première découverte de *Baliothrips sunae* (Thysanoptera : Thripidae) sur son territoire.

En avril et mai 2026, la présence d'une espèce de thrips nouvelle en Europe, identifiée comme étant *Baliothrips sunae*, a été signalée sur des *Carex* ornementaux destinés à la plantation sur quatre sites aux Pays-Bas. Le ravageur a été détecté pour la première fois au cours d'inspections à l'exportation et plusieurs stades de développement ont été trouvés (larves, pupes et adultes). Dans le cas d'une de ces découvertes, les plantes provenaient d'un autre état membre de l'UE.

Aucun dégât important n'a été signalé sur les plantes, sauf dans un cas où il y avait des dégâts sur les feuilles mais plusieurs autres espèces de thrips avaient également été détectées sur les plantes.

À part la description de l'espèce en Chine (Zhang *et al.*, 2018), il existe peu d'informations sur *B. sunae*. Cette espèce a été décrite sur 'graminées' au Zhejiang. Par conséquent, aucune évaluation du risque préliminaire n'a été réalisée par l'ONPV. Aucune mesure officielle n'a été prise.

Le statut phytosanitaire de *Baliothrips sunae* aux Pays-Bas est officiellement déclaré ainsi : **Présent, quelques cas sur des *Carex* destinés à la plantation.**

**Source:** ONPV des Pays-Bas (2026-06). <https://english.nvwa.nl/documents/plant-health/pest-reporting/documents/pest-report-baliothrips-sunae-on-plants-for-planting-of-carex-in-the-netherlands>

Zhang S, Wang Z, Yajin Li & Mound L (2018) One new species, two generic synonyms and eight new records of Thripidae from China (Thysanoptera). *Zootaxa* 4418 (4), 370-378. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4418.4.3>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : BALOSU, NL

### **2026/141 Incursion d'*Erthesina fullo* (Thunberg, 1783) (Hemiptera : Pentatomidae) en Italie**

*Erthesina fullo* (Thunberg) (Hemiptera : Pentatomidae, 'yellow spotted stink bug') est une punaise très polyphage native d'Asie. Comme *Halyomorpha halys*, elle peut contaminer des marchandises dans les échanges commerciaux. Dans la région OEPP, elle a été signalée pour la première fois en Albanie (SI OEPP 2020/170, SI OEPP 2021/133) et quelques spécimens ont été trouvés près d'un port en Grèce (SI OEPP 2025/001). Hors d'Asie, *E. fullo* a été détecté dans l'état de São Paulo au Brésil et a été intercepté en Nouvelle-Zélande.

Un article scientifique signale la première découverte de ce ravageur en Italie, où une femelle adulte a été trouvée début avril 2026 sur un véhicule garé dans une zone urbaine à Montegrotto Terme (province de Padua, région Veneto). Le ravageur a été identifié sur la base de sa morphologie. Les auteurs estiment que cette découverte au début du printemps correspond à l'émergence après l'hiver. Des prospections ciblées ont immédiatement été menées aux environs (dans un rayon de 500 m) avec la participation d'un inspecteur phytosanitaire régional, mais aucun autre spécimen n'a été détecté. Il n'existe aucune indication de l'établissement d'*E. fullo* en Italie.

Une carte de répartition mise à jour est disponible dans EPPO Global Database : <https://gd.eppo.int/taxon/ERTNFU/répartition>

**Source:** Scaccini D, Moretto E, Dioli P, Pozzebon A (2026) First record of *Erthesina fullo* (Thunberg, 1783) (Hemiptera: Pentatomidae) in Italy. *EPPO Bulletin* (early view). <https://doi.org/10.1111/epp.70077>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement, incursion

Codes informatiques : ERTNFU, IT

## **2026/142 Nouveaux signalements d'organismes nuisibles dans le sud des États-Unis**

Le Florida Department of Agriculture and Consumer Services a récemment publié plusieurs alertes phytosanitaires.

*Heliococcus summervillei* (Hemiptera : Pseudococcidae) a été récemment signalé aux États-Unis. Cette cochenille farineuse est un ravageur des pâturages, du gazon et de la canne à sucre. Elle a été décrite en Australie, mais sa zone d'indigénat n'est pas claire (peut-être le Pakistan). Ce ravageur a récemment été introduit dans l'hémisphère occidental, en 2019 et 2020 aux Caraïbes (Porto Rico et Barbade), puis au Mexique en juillet 2025. En octobre 2025, *H. summervillei* a été signalé pour la première fois dans la partie continentale des États-Unis ; il causait un dépérissement des pâturages au Texas. Il s'est ensuite disséminé au Texas et a été signalé en Louisiana sur canne à sucre, puis en mai 2026 en Florida dans des parcelles d'herbe bourrique (*Hemarthria altissima*).

*Pseudaulacaspis rubra* (Hemiptera : Diaspididae) : cette cochenille à bouclier native d'Asie avait auparavant été signalée uniquement en Inde et au Sri Lanka. Elle a été détectée en 2025 sur des manguiers (*Mangifera indica*) matures en Florida. Il s'agit du premier signalement de cette espèce dans l'hémisphère occidental.

Au Texas, un groupe de travail sur l'atténuation des foyers majeurs de la cicadelle du riz *Tagosodes orizicola* (Hemiptera : Auchenorrhyncha) dans les cultures de riz a été mis en place en 2025. Le rice hoja blanca virus (*Tenuivirus oryzae*, RHBV), qui est transmis par *T. orizicola*, a été détecté pour la première fois dans cet état en 2024.

Les interceptions ou incursions suivantes ont également été signalées en Florida en 2025 :

- *Bactericera cockerelli* (Hemiptera : Triozidae - Liste A1 de l'OEPP) : intercepté dans des envois importés ou trouvé chez des grossistes en légumes sur tomatillo (*Physalis philadelphica*) et poivron (*Capsicum annuum*).
- *Bactrocera carambolae* (Diptera : Tephritidae - Liste A1 de l'OEPP) : un spécimen mâle a été capturé dans un piège en 2025 en Florida. Un suivi intensif n'a pas détecté d'autres spécimens ; les mesures officielles ont été levées en juillet 2025.
- *Bactrocera dorsalis* (Diptera : Tephritidae - Liste A1 de l'OEPP) : un spécimen mâle a été capturé dans un piège en 2025 en Florida. Un suivi intensif n'a pas détecté d'autres spécimens ; les mesures officielles ont été levées en juillet 2025.

- Source:** Halbert SE (2025) Entomology Section. P.J. Anderson and G.S. Hodges (Editors). TRI-  
OLOGY 64(2): 11 [https://www.fdacs.gov/content/download/119457/file/FDACS-P-00124\\_2025-08-Tri-ology-64-2-April-June-2025.pdf](https://www.fdacs.gov/content/download/119457/file/FDACS-P-00124_2025-08-Tri-ology-64-2-April-June-2025.pdf)
- Khanal S, Zhou XG (2025) First report of hoja blanca viral disease in rice in Texas, USA. Plant Disease 109(12), 2615. <https://doi.org/10.1094/PDIS-07-25-1410-PDN>
- Ledbetter K (2025-09-18) Texas A&M AgriLife tackles rice delphacid devastation. <https://agrilifetoday.tamu.edu/2025/09/18/texas-am-agrilife-tackles-rice-delphacid-devastation/>
- Powell EC (2026) Pasture mealybug, *Heliococcus summervillei* Brookes (Hemiptera: Coccoomorpha: Pseudococcidae), an invasive pest of pasture grass, turf grass, and sugarcane has been detected in Florida, USA. Pest Alert (Florida Department of Agriculture and Consumer Services Division of Plant Industry) FDACS-P-02267 <https://ccmedia.fdacs.gov/content/download/120429/file/pasture-mealybug-pest-alert.pdf>
- Powell EC, Campo RJ, Lahey Z, Miller DR (2026) *Pseudaulacaspis rubra* (Maskell)(Hemiptera: Coccoomorpha: Diaspididae), reported for the first time in Florida, United States, with an identification key. Insecta Mundi 1187, 1-20. <https://doi.org/10.64338/im.1187.8wz14>
- Powell EC, Miller DR (2025) *Pseudaulacaspis rubra* (Maskell), an armored scale insect detected in South Florida. Pest Alert (Florida Department of Agriculture and Consumer Services Division of Plant Industry) FDACS-P-02256. <https://ccmedia.fdacs.gov/content/download/120245/file/updated-pseudaulacaspis-rubra-pest-alert.pdf>

Mots clés supplémentaires : incursion, nouveaux signalements

Computer codes BCTRCB, DACUDO, HELCSU, PARZCO, RHBV00, SOGAOR, US

### 2026/143 *Prionus imbricornis* (Coleoptera : Cerambycidae), ravageur émergent du myrtillier arbustif aux États-Unis

*Prionus imbricornis* (Coleoptera : Cerambycidae) est une espèce native des États-Unis, présente dans tout l'Est du pays, de New York en Florida, et à l'ouest jusqu'au Kansas et au Texas. Les larves pénètrent dans l'écorce et s'alimentent à la base de la tige de leur arbre-hôte, puis elles creusent vers le bas et évident les racines. Les hôtes confirmés de *P. imbricornis* comportent les chênes (*Quercus* spp.), le châtaignier d'Amérique (*Castanea dentata*) et les pommiers (*Malus* spp.).

Depuis 2010, *P. imbricornis* est considéré être un ravageur émergent des myrtilliers en North Carolina. Il s'agit du premier signalement d'un *Vaccinium* en tant qu'hôte. Des larves ont été trouvées s'alimenter dans des cultures commerciales de myrtillier arbustif (*Vaccinium corymbosum*). Les symptômes d'infestation comprennent un dépérissement des branches observé au début du printemps, un flétrissement des feuilles et un affaiblissement du système racinaire. La détection précoce des infestations est difficile car les larves se trouvent dans les plantes. La zone infestée en Caroline du Nord s'est étendue au cours des 15 dernières années. Les infestations ont principalement été observées sur des myrtilliers âgés de 10 à 14 ans, et quelques myrtilliers âgés de 5 ans. L'article ne précise pas si les jeunes plantes destinés à la plantation pourraient constituer une filière de dissémination.

- Source:** Geisert KA, Powell GS, Lopez L (2026) *Prionus imbricornis* (Coleoptera: Cerambycidae), an emerging pest in North Carolina blueberries. *Journal of Integrated Pest Management* 17(1), pmag018. 17. <https://doi.org/10.1093/jipm/pmag018>

Mots clés supplémentaires : organisme nuisible nouveau, new host plant

Codes informatiques : PRINIM, US

**2026/144 *Potyvirus capsivenamaculae*: addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP**

**Pourquoi:** Le chilli veinal mottle virus (ChiVMV, *Potyvirus capsivenamaculae*) est un virus émergent décrit en Asie, où il provoque des pertes de rendement importantes dans les cultures de piments (*Capsicum* sp.). Il s'est disséminé dans certaines régions d'Asie, ainsi qu'en Afrique et dans l'état d'Hawaï (États-Unis). Ce virus a été signalé pour la première fois dans la région OEPP en Italie en 2015 dans un seul site en plein champ et il a été éradiqué. Étant donné l'importance économique des cultures de piment et de tomate dans la région OEPP, l'ONPV d'Espagne a proposé l'ajout du ChiVMV à la Liste d'Alerte de l'OEPP.

**Où :** Le ChiVMV a été signalé pour la première fois en Malaisie en 1979 et il est désormais largement disséminé dans la partie continentale de l'Asie. Il a également été signalé en Afrique et à Hawaï (États-Unis) en 2018. En 2015, le ChiVMV a été signalé sur des plants de piment cultivés en plein air en Italie. Des mesures d'éradication ont été mises en œuvre et le ChiVMV n'a pas été détecté les années suivantes.

**Afrique :** Bénin, Éthiopie, Ouganda, Sénégal, Tanzanie

**Asie :** Chine (Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Qinghai, Sichuan, Yunnan), en Inde (Assam, Himachal Pradesh, Karnataka, Manipur, Meghalaya, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh), Indonésie (Java, Sulawesi, Sumatra), Malaisie, Myanmar, Pakistan, Philippines, République de Corée, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Vietnam.

**Amérique du Nord :** États-Unis (Hawaï)

**Sur quels végétaux :** le ChiVMV affecte principalement les espèces du genre *Capsicum* (*C. annuum*, *C. baccatum*, *C. chinense*, *C. frutescens*). Des infections naturelles ont été signalées dans des cultures solanacées telles que la tomate (*Solanum lycopersicum*), le tabac (*Nicotiana tabacum*) et l'aubergine amère (*Solanum aethiopicum*), dans d'autres cultures telles que la laitue (*Lactuca sativa*), et sur des adventices (par ex. *Solanum nigrum*, *Datura metel*, *D. innoxia*). Le virus a également été détecté sur plusieurs plantes ornementales (par ex. *Buddleja crispa*, *Commelina* sp.).

**Dégâts :** les symptômes comprennent des marbrures vert foncé, des mosaïques, des stries des nervures et une déformation des feuilles. Dans les cas graves, des stries vert foncé apparaissent sur les tiges et les branches. Les plantes touchées présentent des feuilles plus petites et un rabougrissement, et elles produisent moins de fleurs et des fruits plus petits. Dans les cultures de piment, des pertes de rendement supérieures à 50 % ont été signalées, et l'incidence de la maladie peut atteindre 90 %. L'impact sur le rendement des autres hôtes n'a pas été quantifié. On a signalé des infections mixtes du ChiVMV et d'autres virus, augmentant la sévérité des infections.

**Transmission :** le virus peut être transmis par inoculation mécanique, par greffe et par plusieurs insectes vecteurs de manière non persistante (*Aphis craccivora*, *A. citricidus*, *A. gossypii*, *A. spiraeicola*, *Hysteroneura setariae*, *Myzus persicae*, *Rhopalosiphum maidis*). Il n'est pas transmis par les semences. À longue distance, la filière la plus probable est le commerce de plantes infectées.

**Filières :** plantes-hôtes destinées à la plantation provenant de pays où le ChiVMV est présent.

**Risques éventuels :** Les piments (*Capsicum* spp.) sont des cultures d'importance économique, cultivées sous serre et/ou en plein champ dans l'ensemble de la région OEPP. L'établissement du ChiVMV dans la région OEPP constituerait une menace sérieuse pour la production de piments, et potentiellement pour les cultures d'autres plantes-hôtes (par ex.

tomate et tabac). Les mesures de lutte disponibles contre le ChiVMV se limitent à l'élimination des plantes-hôtes et à la lutte contre les pucerons vecteurs. Des variétés résistantes et tolérantes ont été développées, mais elles ne sont pas encore largement disponibles. Des hôtes ornementaux et sauvages, ainsi que des insectes vecteurs, sont présents dans l'ensemble de la région OEPP, ce qui pourrait faciliter l'établissement et la dissémination du ChiVMV.

### Sources

- Department for Environment Food and Rural Affairs (2022) Rapid pest risk analysis for Chilli veinal mottle virus. Accessible at: <https://pra.eppo.int/prab1774f02-32f1-4a88-9c44-06ae77c06218>
- Gao F, Jin J, Zou W, Liao F, Shen J (2016) Geographically driven adaptation of chilli veinal mottle virus revealed by genetic diversity analysis of the coat protein gene. *Archives of virology* **161**(5), 1329-1333.
- Green SK, Kim JS (1991) Characteristics and control of viruses infecting peppers: a literature review. Asian Vegetable Research and Development Center. Technical Bulletin 18
- Tiberini A, Mangli A, Ahmad A, Cassia U, Tomassoli, L (2017) First report and molecular identification of Chilli veinal mottle virus in Italy. *Journal of Plant Pathology* **99**(2), 523-526.
- Tsai WS, Huang YC, Zhang DY, Reddy K, Hidayat SH, Srithongchai W, Green SK, Jan FJ (2008) Molecular characterization of the CP gene and 3' UTR of Chilli veinal mottle virus from South and Southeast Asia. *Plant Pathology* **57**(3), 408-416. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2007.01780.x>
- Wang X, Larrea-Sarmiento A, Olmedo-Velarde A, Al Rwahnih M, Borth W, Suzuki JY, Wall MM, Melzer M, Hu J (2023) Survey of viruses infecting *Basella alba* in Hawaii. *Plant Disease* **107**(4), 1022-1026. <https://doi.org/10.1094/PDIS-02-22-0449-SR>

Mots clés supplémentaires : Liste d'Alerte

Codes informatiques : CHIVMV

### 2026/145 Premier signalement de la race tropicale 4 de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cupense* au Népal

Le flétrissement du bananier causé par la race tropicale 4 de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cupense* (Liste A2 de l'OEPP) est signalé pour la première fois au Népal. L'organisme nuisible a été détecté en juin et septembre 2024 sur des bananiers (*Musa* sp.) présentant une jaunisse des feuilles et une coloration anormale brun-rougeâtre des tissus vasculaires dans les provinces de Sudurpaschim et de Lumbini. L'identité du pathogène a été confirmée par des tests morphologiques et moléculaires. Des tests de pouvoir pathogène ont également été réalisés. Jusqu'à cette découverte, seule la race 1 de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cupense* était connue causer le flétrissement du bananier au Népal.

**Source:** Khadka RB, Adhikari I, Chanda H, Poudel B, Poudel B, Adhikari J, Ghimire A, Upadhyaya S, Kafle N, Acharya B, Poudel S (2026) First report of *Fusarium oxysporum* f. sp. *cupense* tropical race 4 (VCG 01213/16) causing Fusarium wilt to banana in Nepal. *Plant Disease* (early view) <https://doi.org/10.1094/PDIS-04-26-0736-PDN>

**Photos :** *Fusarium oxysporum* f. sp. *cupense* tropical race 4. <https://gd.eppo.int/taxon/FUSAC4/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : FUSAC4, NP

**2026/146 Premier signalement de *Lecanosticta acicola* en Finlande**

*Lecanosticta acicola* (Liste A2 de l'OEPP), l'agent causal de la tache brune des aiguilles du pin, est signalé pour la première fois en Finlande. En octobre 2025, des chercheurs ont observé un pin de montagne (*Pinus mugo*) ornemental et non natif, dont les aiguilles présentaient des lésions circulaires brunes entourées d'un halo jaune dans la ville de Salo, dans le sud-ouest de la Finlande. Des tests morphologiques et moléculaires ont confirmé l'identité de l'organisme nuisible. Terhonen *et al.* (2026) indiquent que la découverte de *L. acicola* constitue un risque pour le pin sylvestre (*Pinus sylvestris*), espèce native, car la dissémination des hôtes non natifs vers les hôtes natifs est probable, les conditions climatiques sont favorables et l'éradication est difficile une fois l'organisme nuisible établi. *Lecanosticta acicola* est un organisme réglementé non de quarantaine pour l'UE.

La situation de *Lecanosticta acicola* en Finlande peut être décrite ainsi : **Présent, quelques cas (un arbre urbain à Salo, dans le sud-ouest de la Finlande).**

**Source:** Terhonen E, Trifković M, Poimala A (2026) First record of brown spot needle blight (BSNB) caused by *Lecanosticta acicola* on *Pinus mugo* in Finland. *Journal of Plant Diseases and Protection* 133(3), 97 <https://doi.org/10.1007/s41348-026-01293-4>

**Photos :** *Lecanosticta acicola*. <https://gd.eppo.int/taxon/SCIRAC/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : SCIRAC, FI

**2026/147 Présence de la tache bactérienne de la tomate et du poivron en Inde**

Des prospections ont été conduites dans neuf états d'Inde entre mai et octobre de 2019 à 2022 sur la tache bactérienne de la tomate (*Solanum lycopersicum*) et du piment (*Capsicum* sp.). Les espèces de *Xanthomonas* suivantes ont été signalées pour la première fois sur des feuilles et des fruits infectés dans les états suivants :

- *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Liste A2 de l'OEPP) a été signalé sur des plants de tomate et de piment dans les états suivants : Haryana, Punjab, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi, Uttarakhand et Himachal Pradesh.
- *X. vesicatoria* (Liste A2 de l'OEPP) a été signalé sur des plants de tomate dans les états de l'Haryana, du Punjab et de Delhi.
- *X. euvesicatoria* pv. *perforans* (Liste A2 de l'OEPP) a été signalé sur des plants de tomate et de piment dans les états de l'Haryana, du Punjab et de l'Andhra Pradesh.

L'identité des pathogènes a été confirmée par des tests moléculaires. *X. vesicatoria* avait auparavant été signalé uniquement au Karnataka, et le Secrétariat de l'OEPP ne disposait pas d'information sur *X. euvesicatoria* pv. *perforans* et *X. euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* en Inde.

**Source:** Babu PL, Devappa V, Rajender J, Geat N, Devi RS, Patidar R, Singh A, Banarwal VK, Padaria JC, Kamra A, Singh D. Unveiling the prevalence, pathogenic and molecular characterization of *Xanthomonas* strains responsible for bacterial leaf spot of tomato and pepper in India. *Journal of Plant Pathology* (early view) <https://doi.org/10.1007/s42161-026-02202-2>

**Photos :** *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* <https://gd.eppo.int/taxon/XANTEU/photos>  
*Xanthomonas vesicatoria* <https://gd.eppo.int/taxon/XANTVE/photos>  
*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* <https://gd.eppo.int/taxon/XANTPF/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement, signalement détaillé

Codes informatiques : XANTPF, XANTVE, XANTEU, IN

### **2026/148 Premier signalement du tomato brown rugose fruit virus en Écosse (Royaume-Uni)**

L'ONPV du Royaume-Uni a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP du premier foyer du tomato brown rugose fruit virus (*Tobamovirus fructirugosum*, ToBRFV - Liste A2 de l'OEPP) en Écosse. Des mesures d'éradication sont appliquées et comprennent l'élimination de toutes les plantes de la serre touchée et la désinfection de cette serre.

Il y a désormais 6 foyers actifs du ToBRFV au Royaume-Uni (cinq en Angleterre, un en Écosse). Le foyer de Jersey (Îles Anglo-Normandes) (SI OEPP 2025/017) a été éradiqué.

Le statut phytosanitaire du tomato brown rugose fruit virus au Royaume-Uni est officiellement déclaré ainsi : **Présent, non largement disséminé et faisant l'objet d'une lutte officielle.**

**Source:** ONPV du Royaume-Uni (2026-06).

IPPC website. Official Pest Reports - United Kingdom (GBR-40/1 of 2022-06-19) Tomato brown rugose fruit virus. - (TOBRFV) pest report 2026.

<https://www.ippc.int/fr/countries/united-kingdom/pestreports/2026/06/tomato-brown-rugose-fruit-virus-tobrfv-2026/>

**Photos :** Tomato brown rugose fruit virus. <https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos>

Mots clés supplémentaires : signalement détaillé, éradication

Codes informatiques : TOBRFV, GB, JS

### **2026/149 Mise à jour sur la situation du citrus yellow vein clearing virus en Espagne**

En Espagne, le citrus yellow vein clearing virus (*Potexvirus citriflavivenae*, CYVCV, Liste d'Alerte de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en septembre 2025 en Cataluña et Comunidad Valenciana (SI OEPP 2026/039). L'ONPV d'Espagne a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP des premières découvertes du CYVCV dans les communautés autonomes d'Andalucía et de Région de Murcia.

#### **Andalucía**

Des prospections officielles ont été menées en 2026 dans des pépinières et des vergers commerciaux d'agrumes.

Le CYVCV a été détecté en mai 2026 sur un citronnier (*Citrus x limon* 'Verna') âgé d'un an et présentant des symptômes, dans une plantation de la commune d'Huércal-Overa (province d'Almería). L'identité de l'organisme nuisible a été confirmée par le laboratoire de référence national. L'agriculteur a décidé d'arracher tous les agrumes de la parcelle.

Au cours de prospections supplémentaires menées en mai 2026, des orangers (*Citrus x aurantium* var. *sinensis*) asymptomatiques de deux plantations des communes de Vera et d'Huércal-Overa ont donné un résultat positif aux tests pour le CYVCV. Aucune zone délimitée n'a été établie, mais des mesures phytosanitaires préventives ont été appliquées, notamment l'application de produits phytosanitaires et la lutte contre les pucerons vecteurs.

**Región de Murcia**

Suite au signalement de symptômes du CYVCV par deux agriculteurs, le CYVCV a été détecté en avril 2026 sur quatre citronniers (*Citrus × limon*) âgés d'un an présentant des symptômes et sur un oranger (*Citrus × aurantium* var. *sinensis* 'Sanguinelli') âgé d'un an et asymptomatique, dans des plantations situées dans les communes de Blanca et de Mula (province de Murcia). Le virus a été identifié par des tests moléculaires. Les plantules provenaient de pépinières d'autres régions d'Espagne. Aucune zone délimitée n'a été établie, mais des mesures phytosanitaires préventives sont appliquées, y compris des traitements contre les insectes vecteurs, la destruction des végétaux positifs pour le CYVCV et la désinfection des outils de tailles. Des prospections visant à détecter le CYVCV dans les pépinières et les plantations de jeunes arbres sont en cours.

Le statut phytosanitaire du citrus yellow vein clearing virus en Espagne est officiellement déclaré ainsi : **Présent, dans certaines parties de l'état membre où des plantes-hôtes sont cultivées, donnant lieu à une action phytosanitaire, sous surveillance.**

Source: ONPV d'Espagne (2026-06).

Photos : *Potexvirus citriflavivenae*. <https://gd.eppo.int/taxon/CSYV00/photos>

Mots clés supplémentaires : signalement détaillé

Codes informatiques : CSYV00, ES

**2026/150 Nouveau signalement de *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* en Espagne**

En Espagne, *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (Liste A2 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois dans des semences en 2001 ; il a ensuite été signalé causer le flétrissement bactérien du haricot (*Phaseolus vulgaris*) dans des parcelles en Andalucía en 2004 (SI OEPP 2006/120), avant d'être éradiqué en 2011.

En novembre 2025, 21 lots de haricot (*Phaseolus vulgaris* cv. 'Riñón') ont fait l'objet d'un échantillonnage dans 12 parcelles des communes de Pozuelo del Páramo et de Roperuelos del Páramo (province de León, communauté autonome de Castilla y León). Ces lots provenaient d'un site d'indication géographique protégée et étaient destinés à la consommation humaine. En avril 2026, le laboratoire de référence national a identifié *C. flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* dans un échantillon d'un des lots à l'aide de tests moléculaires. Des mesures phytosanitaires visant à éradiquer le pathogène sont mises en œuvre conformément au Règlement (UE) 2016/2031. Elles comprennent la destruction du lot infesté et l'interdiction de cultiver des Fabaceae dans la zone délimitée (qui correspond aux parcelles dans lesquelles les haricots du lot infecté avaient été cultivés). Un suivi sera réalisé en 2026 et 2027.

Le statut phytosanitaire de *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* en Espagne est officiellement déclaré ainsi : **Transitoire, donnant lieu à une action phytosanitaire, en cours d'éradication.**

Source: ONPV d'Espagne (2026-05).

Photos : *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens*.  
<https://gd.eppo.int/taxon/CORBFL/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : CORBFL, ES

**2026/151 Nouveau signalement de *Clavibacter sepedonicus* en Italie (Calabria)**

L'ONPV d'Italie a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP de la détection de *Clavibacter sepedonicus* (Liste A2 de l'OEPP) en mars 2026 sur des pommes de terre de consommation (*Solanum tuberosum*) provenant d'entrepôts situés dans les communes de Spezzano et de Celio (province de Cosenza, région Calabria). Au cours de prospections officielles, vingt échantillons de 200 tubercules asymptomatiques ont été testés pour la bactérie. *C. sepedonicus* a été identifié dans deux échantillons par des tests moléculaires. Des mesures phytosanitaires sont appliquées aux fins de l'éradication, y compris la destruction de toutes les pommes de terre présentes dans les entrepôts, ainsi que la désinfection des machines et des installations de stockage où les tubercules infectés avaient été trouvés.

Le statut phytosanitaire de *Clavibacter sepedonicus* en Italie est officiellement déclaré ainsi : **Présent**.

**Source :** ONPV d'Italie (2026-06).

**Photos :** *Clavibacter sepedonicus*. <https://gd.eppo.int/taxon/CORBSE/photos>

Mots clés supplémentaires : signalement détaillé

Codes informatiques : CORBSE, IT

**2026/152 Éradication du tomato leaf curl New Delhi virus en Slovaquie**

Le tomato leaf curl New Delhi virus (*Begomovirus solanumdelhiense*, ToLCNDV, Liste A2 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en Slovaquie en juillet 2022 sur des plants de pastèque (*Citrullus lanatus*) présentant des symptômes dans une petite exploitation agricole de la commune de Seňa (région de Košice, dans l'est de la Slovaquie), et des mesures d'éradication ont été appliquées (SI OEPP 2022/169). L'ONPV de Slovaquie a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP que le ToLCNDV a été éradiqué sur son territoire.

Le statut phytosanitaire du tomato leaf curl New Delhi virus en Slovaquie est officiellement déclaré ainsi : **Éradiqué**.

**Source :** ONPV de Slovaquie (2026-05).

**Photos :** Tomato leaf curl New Delhi virus. <https://gd.eppo.int/taxon/TOLCND/photos>

Mots clés supplémentaires : éradication, absence

Codes informatiques : TOLCND, SK

**2026/153 Vecteurs potentiels du grapevine red blotch virus**

*Spissistilus festinus* (Hemiptera : Membracidae) est le seul vecteur actuellement connu du grapevine red blotch virus (*Grabovirus vitis*, GRBV - Liste A1 de l'OEPP). Cette espèce n'est toutefois pas présente dans certains vignobles fortement infectés, ce qui indique que d'autres vecteurs sont impliqués.

Deux articles récents signalent des vecteurs potentiels du GRBV :

Au cours d'une prospection menée en 2018-2019 dans un vignoble infesté par le GRBV en Oregon (États-Unis), les cicadelles *Euscelidius variegatus* (Hemiptera : Cicadellidae) et *Dikraneura absentia* (Hemiptera : Cicadellidae), ainsi qu'une espèce *Nothodelphax* sp., ont

donné un résultat positif aux tests sur le GRBV, et des essais de transmission ont montré que ces espèces pouvaient transmettre le virus.

Une prospection menée en 2023-2024 en Baja California (Mexique) a montré que *Tortistilus wickhami* (Hemiptera : Membracidae) peut acquérir le virus en plein champ et au laboratoire. Aucune transmission vers des plantes réceptrices n'a en revanche été observée dans des essais de transmission.

*T. wickhami* est largement disséminé en Amérique du Nord. Auparavant connu du Canada au sud de la California, il a été signalé pour la première fois en Baja California (Mexique) en 2023.

- Source:** Ford-Villalón C, Schneider D, Montesinos-Solano I, Carrillo-Tripp J (2026) Potential transmission of grapevine red blotch virus (*Grabovirus vitis*, Geminiviridae) by Nearctic treehopper (*Tortistilus wickhami*) in Baja California, Mexico. *Revista mexicana de fitopatología* 44(2). <https://doi.org/10.18781/r.mex.fit.2512-4>
- Schneider D, Ford-Villalón C, Acosta-Ramos K, Carrillo-Tripp J, Monjarás-Barrera JI, Ceccarelli FS (2025) First record of *Tortistilus wickhami* (Van Duzee, 1908)(Hemiptera: Membracidae) in Vineyards of Valle de Guadalupe, Baja California, Mexico. *Psyche: A Journal of Entomology* 2025, 8375004. <https://doi.org/10.1155/psyc/8375004>
- Lee JC, Keller K, Lake AJ, Soule ML, Martin RR (2026) Surveying for potential grapevine red blotch virus vectors in an Oregon vineyard. *Journal of Economic Entomology* 119(3), 1639-1645.

**Photos :** Grapevine red blotch virus. <https://gd.eppo.int/taxon/GRBAV0/photos>

**Mots clés supplémentaires :** étiologie, vecteur

**Codes informatiques :** DIKRAS, EUSDVA, GRBAV0, TORZWI

**2026/154 Étude sur le potentiel de la lutte biologique contre *Parthenium hysterophorus* à Oman**

*Parthenium hysterophorus* (Asteraceae : Liste A2 de l'OEPP) est une plante très envahissante qui a des impacts négatifs dans le monde entier sur la diversité biologique et la production agricole. À Oman, *P. hysterophorus* peut envahir des habitats naturels et des habitats agricoles. Des prospections ont été menées dans la région de Dhofar, soumise à l'influence de la mousson, afin de déterminer les espèces d'insectes associées à cette plante. Au total, quinze groupes d'insectes appartenant à plusieurs ordres (Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hemiptera et Orthoptera) ont été observés s'alimenter sur la plante. Des espèces de lépidoptères (par ex. *Hypena*) et de diptères (par ex. *Lethyna* et *Liriomyza*) causaient des dégâts importants sur le feuillage et les fleurs de *P. hysterophorus*, et pourraient offrir des possibilités intéressantes pour la lutte biologique. Sur certains sites, des espèces du genre *Hypena* infestaient jusqu'à 60 % des plantes de *P. hysterophorus* étudiées. Des études supplémentaires sont nécessaires sur la taxonomie, le cycle de développement, la spécificité d'hôte et les interactions écologiques afin de déterminer si ces espèces pourraient être intégrées dans des programmes de lutte biologique contre *P. hysterophorus*.

**Source:** Al-Jahdhami AA, Al-Subhi AM, Akaak MM, Al-Wahahibi AK (2026) Investigation of biological control agents for the invasive plant *Parthenium hysterophorus* L. (Asteraceae) in Southern Oman. *BioAssay* 21, ba21002  
<https://doi.org/10.37486/1809-8460.ba21002>

**Mots clés supplémentaires :** plantes exotiques envahissantes, agents de lutte biologique

**Codes informatiques :** PTNHY, OM

**2026/155 Suivi post-lâcher d'agents de lutte biologique contre *Alliaria petiolata* au Canada**

*Alliaria petiolata* (Brassicaceae) est native de la région OEPP, et il s'agit d'une plante exotique envahissante au Canada et aux États-Unis. *A. petiolata* est une espèce bisannuelle qui forme une rosette la première année et développe une tige et des fleurs la deuxième année. En Amérique du Nord, elle a des impacts négatifs sur la diversité biologique et les services écosystémiques, car elle peut entrer en compétition avec les plantes natives et ses effets allélopathiques peuvent affecter les micro-organismes du sol et le cycle des éléments nutritifs. Au Canada, *Ceutorhynchus scrobicollis* (Coleoptera : Curculionidae) a été lâché en 2023 en tant qu'agent de lutte biologique contre *A. petiolata* sur des sites en Ontario, en British Columbia et en Alberta. Un programme de suivi post-lâcher a été mis en place pour évaluer son efficacité. Lors de ce programme de suivi, le coléoptère natif *Mordellina ancilla* (Coleoptera : Mordellidae) a été trouvé dans des tiges d'*A. petiolata*. Des prospections supplémentaires ont montré que *M. ancilla* est un foreur commun des tiges d'*A. petiolata*, en fin de deuxième année et sur les plantes mortes. Les observations sur le cycle de développement de *M. ancilla* indiquent qu'un impact négatif sur la croissance et la reproduction d'*A. petiolata* est peu probable et qu'il n'affecte probablement pas l'utilisation de *C. scrobicollis* en tant qu'agent de lutte biologique.

**Source:** Hall TCK, McTavish MJ, Boutchier RS, Smith SM (2025) First record of the native beetle *Mordellina ancilla* (Coleoptera: Mordellidae) in association with introduced garlic mustard (Brassicaceae) in Ontario, Canada. *The Canadian Entomologist* 157, e19, 1-12. <https://doi.org/10.4039/tce.2025.7>

Mots clés supplémentaires : agents de lutte biologique,  
plante exotique envahissante

Codes informatiques : ALAPE, CEUTSC, MOREUS, CA

## **2026/156 Introduction accidentelle d'*Ophraella communa* dans la région OEPP**

*Ambrosia artemisiifolia* (Asteraceae : Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP) est native d'Amérique du Nord et il s'agit d'une plante exotique envahissante dans la région OEPP, en Asie, en Afrique et en Australie. *A. artemisiifolia* est une adventice annuelle qui entre en compétition avec les plantes cultivées pour l'eau et les éléments nutritifs. Elle a également un impact sur la santé à cause de son pollen fortement allergène. La chrysomèle herbivore nord-américaine *Ophraella communa* (Coleoptera : Chrysomelidae) est un ennemi naturel d'*A. artemisiifolia* dans sa zone d'indigénat et elle a été introduite accidentellement en Asie et dans la région OEPP. Sa présence a été signalée pour la première fois en Europe dans le nord de l'Italie en 2013 (SI OEPP 2013-204), puis en Suisse la même année. Elle a été signalée en Bosnie-Herzégovine (2020), en Croatie (2018), en France (2023), en Hongrie (2020), en Roumanie (2020), en Serbie (2020), en Slovénie (2017) et, plus récemment, en Autriche (2024) et en Slovaquie (2024). Son efficacité en tant qu'agent de lutte biologique a été démontrée, notamment dans la région de Milano (Lombardia, Italie), où elle a réduit de 86 % la concentration aérienne de pollen d'*A. artemisiifolia*. Malgré les nombreuses recherches menées sur la spécificité d'hôte d'*O. communa*, le risque environnemental potentiel de ce coléoptère pour les pays OEPP reste à déterminer. La gamme d'hôtes d'*O. communa* n'est pas entièrement claire, et elle pourrait être plus vaste que la gamme actuellement connue. Des études supplémentaires sur la spécificité d'hôte devraient être menées afin d'évaluer les risques potentiels qu'*O. communa* présente pour les espèces non ciblées dans les habitats agricoles et naturels.

**Source:** Nduwayo P, Schaffner U, Tarigan SI, Dorner Z, Kiss J, Desneux N, Lesieur V, Rousset Z, Müller-Schärer H, Toepfer S (2025) Risk assessment approaches for *Ophraella communa* as a biological control agent for *Ambrosia artemisiifolia* in agricultural landscapes of southeastern Central Europe: a review. *Agronomy* 15, 1771. <https://doi.org/10.3390/agronomy15081771>

Mots clés supplémentaires : agents de lutte biologique,  
plantes exotiques envahissantes

Codes informatiques : AMBEL, OPHLCO

**2026/157    *Physalis longifolia* dans la région OEPP : addition à la Liste d'Alerte de l'OEPP**

**Pourquoi**

*Physalis longifolia* (Solanaceae) est signalée dans la région OEPP, où elle peut être présente dans les parcelles agricoles. Le Panel OEPP sur les plantes exotiques envahissantes recherche des informations supplémentaires sur toute autre cas de présence de *P. longifolia* dans la région OEPP.

**Répartition géographique**

**Région OEPP :** Autriche, Italie

**Afrique :** Afrique du Sud, Kenya, La Réunion, Maurice, Zimbabwe

**Asie :** Myanmar, République de Corée

**Amérique du Nord :** États-Unis\* (Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming)

**Océanie :** Australie (Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria)

\* = Répartition native

**Morphologie**

*Physalis longifolia* est une plante herbacée vivace qui pousse à partir d'un caudex profond et se dissémine par des pousses issues des racines latérales. Les tiges sont dressées, souvent ramifiées, et généralement couvertes de poils fins qui leur donnent une texture rugueuse ; elles mesurent 30-100 cm de haut et sont souvent violacées.

**Biologie et écologie**

Le nombre moyen de graines par plante est d'environ 400, mais les grandes plantes peuvent produire près de 4000 graines par an. Des petits morceaux de rhizome peuvent se régénérer en plantes viables.

**Habitats**

*Physalis longifolia* peut pousser sur les terres cultivées, dans les pâturages et en bord de routes. En Autriche, elle a été signalée dans des parcelles de soja et de maïs.

**Filières**

Les filières internationales comprennent les graines en tant que contaminant du grain et des semences destinées à la plantation. Les graines peuvent être dispersées par les pratiques agricoles. La dissémination naturelle est assurée par les animaux qui mangent les fruits et dispersent les graines dans leurs excréments. Les fruits flottent et peuvent être transportés par les cours d'eau.

**Impacts**

*Physalis longifolia* peut avoir un impact négatif sur les rendements agricoles lorsqu'elle envahit des zones agricoles. Elle peut entrer en compétition avec les cultures et peut avoir des impacts économiques en contaminant celles-ci. *P. longifolia* est une plante-hôte de plusieurs organismes nuisibles, par ex. *Bactericera cockerelli* (Liste A1 de l'OEPP). Toutes les parties de la plante sont toxiques.

**Lutte**

Les mesures de gestion comprennent des mesures de lutte physique et mécanique. La lutte à l'aide d'herbicides est possible, mais leur utilisation est limitée dans certains habitats.

**Source:** Corral CAR, Cooper WR, Horton D, Miliczky E, Riebe J, Waters T, Wildung M, Karasev AV (2021) Association of *Bactericera cockerelli* (Hemiptera: Trioziidae) with the perennial weed *Physalis longifolia* (Solanales: Solanaceae) in the potato-growing regions of Western Idaho. *Environmental Entomology* **50** 1416-1424.  
 Portal to the Flora of Italy (2026) *Physalis longifolia* Nutt. [https://dryades.units.it/floritaly/index.php?procedure=taxon\\_page&tipo=all&id=12749](https://dryades.units.it/floritaly/index.php?procedure=taxon_page&tipo=all&id=12749)  
 Zernig K, Griehl N, Kniely G, Kundigraber W, Leonhartsberger S, Pörtl M, Stöhr O (2025) Bemerkenswertes zur Flora der Steiermark 12. *Natura Styriaca* **1**, 208-220.

**Photos :** *Physalis longifolia*. <https://gd.eppo.int/taxon/PHYLF/photos>

Mots clés supplémentaires : Liste d'Alerte

Codes informatiques : PHYLF

## 2026/158 Établissement de priorités pour les espèces de plantes de la Liste d'Alerte de l'OEPP

En mai 2026, le Panel OEPP sur les plantes exotiques envahissantes a évalué trois espèces de la Liste d'Alerte de l'OEPP à l'aide de la Norme PM 5/6 *Procédure de l'OEPP pour l'établissement de priorités pour les plantes exotiques envahissantes*. Un résumé est présenté ci-dessous pour chaque espèce.

### ***Acalypha australis* (Euphorbiaceae)**

*Acalypha australis* est native d'Asie et a été signalée dans plusieurs pays OEPP. La dissémination naturelle par les graines peut favoriser la dissémination locale. Il est toutefois peu probable que les graines puissent être disséminées à longue distance, car rien n'indique qu'elles soient dispersées par le vent ou les oiseaux qui s'en alimentent. *A. australis* pourrait se disséminer par le biais de pratiques agricoles, y compris le mouvement de machines et d'équipements. Le potentiel de dissémination a été jugé élevé, tout comme l'impact potentiel sur l'agriculture. Par conséquent, *A. australis* a été transférée de la Liste d'Alerte à la Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP. En raison du risque d'entrée et de dissémination, *A. australis* est une priorité pour l'analyse du risque phytosanitaire.

### ***Ambrosia grayi* (Asteraceae)**

*Ambrosia grayi* est native d'Amérique du Nord (États-Unis, Mexique) et il s'agit d'une espèce transitoire en Israël. Aux États-Unis, *A. grayi* peut se reproduire par graines et par rhizomes, ces derniers pouvant s'enfoncer jusqu'à 3 m de profondeur dans le sol. En Israël, on estime peu probable que la reproduction sexuée contribue de manière importante à la dissémination. Au Texas (États-Unis), *A. grayi* est fortement compétitive dans des cultures telles que le coton et le sorgho. Le potentiel de dissémination a été jugé modéré, tout comme l'impact potentiel sur l'agriculture. Par conséquent, *A. grayi* a été transférée de la Liste d'Alerte à la Liste d'observation de l'OEPP.

### ***Aponogeton distachyos* (Aponogetonaceae)**

*Aponogeton distachyos* est native d'Afrique du Sud et a une répartition limitée dans l'environnement naturel de la région OEPP. Elle peut être disséminée par des mécanismes naturels ou des activités humaines. Les fruits mûrs peuvent flotter pendant une période courte avant de libérer des graines plus denses que l'eau qui peuvent se déplacer avec le

courant. *A. distachyos* peut former des tapis flottants susceptibles de réduire la transmission de la lumière et d'altérer la qualité des cours d'eau en diminuant les niveaux d'oxygène. La plante peut avoir un impact négatif sur les services écosystémiques, par exemple en réduisant l'accès à l'eau ou en bloquant les canaux d'irrigation. Le potentiel de dissémination a été jugé élevé, ainsi que l'impact potentiel sur la diversité biologique et les habitats. Par conséquent, *A. distachyos* a été transférée de la Liste d'Alerte à la Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP. En raison du risque d'entrée et de dissémination, *A. distachyos* est une priorité pour l'analyse du risque phytosanitaire.

**Source:** Panel OEPP sur les plantes exotiques envahissantes (2026-05).

EPPO (2012) PM 5/6 EPPO prioritization process for invasive alien plants. EPPO Bulletin, 42, 463-474. <https://doi.org/10.1111/epp.2592>

**Photos :** *Acalypha australis*. <https://gd.eppo.int/taxon/ACCAU/photos>  
*Ambrosia grayi*. <https://gd.eppo.int/taxon/AMBGR/photos>  
*Aponogeton distachyos*. <https://gd.eppo.int/taxon/APGDI/photos>

**Mots clés supplémentaires :** plantes exotiques envahissantes, établissement de priorités

**Codes informatiques :** ACCAU, AMBGR, APGDI

### 2026/159 *Ambrosia psilostachya* et *Xanthium spinosum* : addition à la Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP

En mai 2026, le Panel OEPP sur les plantes exotiques envahissantes a étudié deux plantes exotiques largement disséminées à l'aide de la Norme PM 5/6 *Procédure de l'OEPP pour l'établissement de priorités pour les plantes exotiques envahissantes*. Le Panel a décidé d'ajouter ces deux espèces sur la Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP.

#### ***Ambrosia psilostachya* (Asteraceae)**

*Ambrosia psilostachya* est native d'Amérique du Nord et largement disséminée dans la région OEPP. La dissémination naturelle a lieu par les graines et les rhizomes. Les graines sont dispersées par le vent et peuvent tomber dans l'eau. On a montré que les courants marins peuvent transporter les propagules de la plante jusqu'à 170 km à partir de ou vers les dunes côtières. Dans la région OEPP, *A. psilostachya* peut avoir des impacts négatifs sur la diversité biologique et les services écosystémiques. *A. psilostachya* n'est actuellement pas une espèce commune dans les systèmes agricoles de la région OEPP. Cependant, avec l'évolution des habitats et de l'occupation des sols, et sous l'effet du changement climatique, la plante pourrait s'établir et causer un impact dans les systèmes agricoles.

#### ***Xanthium spinosum* (Asteraceae)**

*Xanthium spinosum* est native des Amériques et établie dans plus de 20 pays OEPP. La dissémination est assurée par ses graines, qui peuvent être dispersées par l'eau, les animaux et les activités humaines. *X. spinosum* peut pousser dans divers habitats où elle peut avoir des impacts négatifs sur la diversité biologique et les services écosystémiques. Des études ont montré que les espèces végétales natives et la stabilité des communautés végétales diminuent lorsque que le pourcentage de couverture de *X. spinosum* augmente.

**Source:** Panel OEPP sur les plantes exotiques envahissantes (2026-05).

EPPO (2012) PM 5/6 EPPO prioritization process for invasive alien plants. EPPO Bulletin, 42, 463-474. <https://doi.org/10.1111/epp.2592>

**Photos :** *Xanthium spinosum*. <https://gd.eppo.int/taxon/XANSP/photos>

**Mots clés supplémentaires :** plantes exotiques  
envahissantes

**Codes informatiques :** AMBPS, XANSP

### **2026/160 Premier signalement de *Furcraea hexapetala* au Maroc**

*Furcraea hexapetala* (Asparagaceae) est native d'Amérique centrale et il s'agit d'une espèce ornementale très appréciée dans de nombreuses régions du monde. Des prospections botaniques ont été conduites entre janvier et septembre 2025 dans la région de Tanger (nord du Maroc). Une petite population naturalisée de *F. hexapetala* a été observée sur des versants côtiers dans la forêt du Cap Spartel, à l'ouest de Tanger. Un autre cas de présence a été trouvé près de Rabat, le long de l'arboretum de l'Oued Cherrat. Il semble que cette population ait été introduite par des plantations, ensuite abandonnées, et qu'elle s'étende désormais par voie naturelle. Au Maroc, la floraison a lieu de février à mars et d'août à septembre. Les bulbilles sont formées d'avril à septembre et d'octobre à janvier. *F. hexapetala* est jugée envahissante aux îles Galápagos (Équateur), où elle peut former des peuplements denses susceptibles d'entrer en compétition avec les espèces natives.

**Source:** Bakali AH, Khamar H, Verloove F (2026) *Furcraea hexapetala* (Asparagaceae, Agavoideae), a naturalised species new to the flora of Morocco. *Bradleya* 44, 152-162. <https://doi.org/10.25223/brad.n44.2026.a16>

**Mots clés supplémentaires :** nouveau signalement, plantes  
exotiques envahissantes

**Codes informatiques :** FURCU, MA