



ORGANISATION EUROPEENNE
ET MEDITERRANEENNE
POUR LA PROTECTION DES PLANTES

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN
PLANT PROTECTION
ORGANIZATION

OEPP

Service d'Information

No. 10 PARIS, 2026-10

Général

-
- | | |
|----------|--|
| 2026/226 | Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP |
| 2026/227 | Nouvelles additions aux Listes A1 et A2 de l'OEPP |
| 2026/228 | Mise à jour sur la situation des organismes nuisibles réglementés au Chili |
| 2026/229 | L'OEPP recrute un nouveau Directeur-général/une nouvelle Directrice-générale |
| 2026/230 | Euphresco recrute un nouveau Coordinateur/une nouvelle Coordinatrice |

Ravageurs

-
- | | |
|----------|---|
| 2026/231 | Incursion de <i>Lycorma delicatula</i> en Belgique |
| 2026/232 | Découverte d' <i>Agrilus planipennis</i> dans la région de Transcarpatie en Ukraine |
| 2026/233 | La carte dynamique de l'OEPP sur la dissémination de l'agrile du frêne, <i>Agrilus planipennis</i> , est désormais en ligne |
| 2026/234 | Incursion de <i>Corythucha arcuata</i> au Bélarus |
| 2026/235 | Première observation de <i>Keiferia lycopersicella</i> en Arménie |
| 2026/236 | Nouvelles incursions de <i>Popillia japonica</i> en Autriche |
| 2026/237 | Mise à jour sur la situation d' <i>Anoplophora glabripennis</i> en Allemagne |
| 2026/238 | <i>Eotetranychus lewisi</i> à nouveau trouvé en Suisse |
| 2026/239 | Premier signalement de la cochenille <i>Acutaspis paulista</i> en Espagne et dans la région OEPP |

Maladies

-
- | | |
|----------|--|
| 2026/240 | Premier signalement de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>fastidiosa</i> au Luxembourg |
| 2026/241 | Premier signalement de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i> en Calabrie, en Italie |
| 2026/242 | Premier signalement de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>fuscans</i> aux Pays-Bas |
| 2026/243 | Premier signalement de 'Candidatus Phytoplasma katsepyensis', une nouvelle espèce impliquée dans la maladie 'palm lethal yellowing' à Madagascar |
| 2026/244 | Premier signalement de 'Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus' sur maïs |
| 2026/245 | <i>Pleurotus citrinopileatus</i> , champignon envahissant échappé de culture |
| 2026/246 | Éradication de <i>Meloidogyne enterolobii</i> au Portugal |

Agents de lutte biologique

-
- | | |
|----------|--|
| 2026/247 | Potentiel de la lutte biologique préventive contre <i>Aleurocanthus woglumi</i> (Liste A1 de l'OEPP) |
| 2026/248 | Évaluation d'augmentoria en plein champ pour <i>Ganaspis kimorum</i> |
| 2026/249 | Lutte biologique contre <i>Cryptostegia madagascariensis</i> au Brésil |

Plantes envahissantes

-
- | | |
|----------|---|
| 2026/250 | Les milieux de culture en tant que filières d'introduction de plantes exotiques |
| 2026/251 | Coûts économiques mondiaux des plantes envahissantes |
| 2026/252 | Les plantes coupées d' <i>Impatiens glandulifera</i> peuvent produire des graines viables |
| 2026/253 | Espèces de plantes exotiques au Kazakhstan |

2026/226 Nouvelles données sur les organismes de quarantaine et les organismes de la Liste d'Alerte de l'OEPP

En parcourant la littérature, le Secrétariat de l'OEPP a extrait les nouvelles informations suivantes sur des organismes de quarantaine et des organismes nuisibles de la Liste d'Alerte de l'OEPP (ou précédemment listés). La situation de l'organisme concerné est indiquée en gras, dans les termes de la NIMP no. 8.

- **Nouveaux signalements**

Le charançon noir du figuier, *Aclees taiwanensis* (Coleoptera : Curculionidae), est signalé pour la première fois en Türkiye. Il a été détecté sur figuier (*Ficus carica*) en octobre 2024 sur plusieurs sites de la commune de Sarıyer-Bahçeköy (province d'Istanbul) (Bacak *et al.*, 2026). **Présent, non largement disséminé et ne faisant pas l'objet d'une lutte officielle.**

La mineuse nord-américaine *Aspilanta oinophylla* (Lepidoptera : Heliozelidae) (anciennement *Antispila oinophylla*) est signalée pour la première fois en Slovénie. Elle a été observée pour la première fois en 2021 dans plusieurs vignobles (*Vitis vinifera*) de l'ouest de la Slovénie, probablement suite à sa dissémination naturelle depuis l'Italie. Entre 2022 et 2024, un suivi a confirmé sa présence dans 22 localités, dans la région de Goriška, le Kras et la partie côtière du pays. Aucun dégât important n'a été signalé (Žežlina *et al.*, 2026). Cette espèce a été signalée pour la première fois dans la région OEPP en Italie en 2007 (SI OEPP 2013/012) et est également présente au Tessin (Suisse). **Présent, non largement disséminé et ne faisant pas l'objet d'une lutte officielle.**

Monosporascus cannonballus (précédemment sur la Liste d'Alerte de l'OEPP) est signalé pour la première fois en Australie. Ce champignon pathogène provoque une pourriture des racines dans les cultures de cucurbitacées. Il a été détecté dans deux localités du Northern Territory, dans la région de Darwin sur des plants de concombre (*Cucumis sativus*), et dans la région de Katherine sur melon d'hiver (*Cucumis melo* var. *inodorus*) et melon (*Cucumis melo*). Les autorités jugent peu probable que la maladie puisse être éradiquée en Australie (AusVeg, 2026). **Présent, non largement disséminé et ne faisant pas l'objet d'une lutte officielle.**

Des nématodes à kystes de la pomme de terre sont signalés pour la première fois au Yémen. Des prospections ont été menées en 2023 dans des parcelles de pomme de terre (*Solanum tuberosum*) des gouvernorats d'Amran, de Dhamar et d'Ibb (dans l'ouest du pays). Des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés dans ces trois gouvernorats. Les nématodes ont été identifiés au niveau du genre, et on ignore si *Globodera pallida*, *G. rostochiensis* ou les deux espèces sont présents au Yémen (Showkat & Saeed, 2026). **Présent, largement disséminé.**

Le potato mop-top virus (*Pomovirus solani*, PMTV) est signalé pour la première fois en Italie. Il a été détecté sur un tubercule de pomme de terre de consommation (*Solanum tuberosum*) rejeté en octobre 2025 en Calabria. Une prospection a été menée dans la zone entre 2021 et 2025, et aucun symptôme ressemblant aux symptômes du PMTV n'a été observé dans les parcelles et les tubercules récoltés. Des études supplémentaires sont en cours afin de déterminer la filière d'introduction et d'évaluer la présence du PMTV dans la zone (Tiberini *et al.*, 2026).

La chenille processionnaire du chêne, *Thaumetopoea processionea* (organisme de quarantaine de zone protégée de l'UE (EU) 2019/2072, Annexe III), est signalée pour la première fois en Inde. Un groupe de chenilles a été découvert dans l'état du Maharashtra en août 2025 sur des goyaviers (*Psidium* sp.). Un mâle adulte a été identifié comme étant *T.*

processionea par des méthodes morphologiques (Theurkar, 2026). L'article a été publié dans une revue évaluée par des pairs, mais étant donné qu'il s'agit du premier signalement de *T. processionea* en Asie, sur une nouvelle plante-hôte, et que l'identification n'a pas été confirmée par un spécialiste, le Secrétariat de l'OEPP estime que ce signalement reste à confirmer.

- **Signalements détaillés**

En Chine, le cherry rasp leaf virus (*Cheravirus avii*, CRLV - Liste A1 de l'OEPP), dont la présence n'était jusqu'alors connue qu'en Amérique du Nord, a été signalé pour la première fois en 2002 au Liaoning, puis en 2013 au Shandong (dans le nord-est de la Chine) (SI 2015/079). En 2024, il a été signalé pour la première fois dans le nord-ouest de la Chine, dans la province du Qinghai, sur des cerisiers (*Prunus avium*). Les virus suivants ont également été signalés pour la première fois dans cette province : cherry green ring mottle virus (*Robigovirus viridiavii*, CGRMV - ORNQ de l'UE), cherry virus A (CVA, *Capillovirus alphavii*), little cherry virus 1 (*Velarivirus nanoavii*, LChV1 - ORNQ de l'UE), prunus necrotic ringspot virus (*Ilarvirus PNRSV*, PNRSV - ORNQ de l'UE) et prune dwarf virus (*Ilarvirus PDV*, PDV - ORNQ de l'UE). Ils ont été identifiés par des tests ELISA (Zhang *et al.*, 2026).

En Uruguay, *Euwallacea fornicatus* (Coleoptera : Curculionidae : Scolytinae - Liste A2 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en 2023 à Montevideo et en 2024 dans le département de Rivera (SI 2025/118). En date de 2026, il a été détecté sur des arbres urbains dans quatre départements : Montevideo, Canelones, Rivera et Paysandú. Aucun cas n'a été observé dans la production forestière ou autres systèmes de production (ONPV d'Uruguay, 2026).

Aux États-Unis, le flétrissement du laurier causé par *Harringtonia lauricola* (Liste A1 de l'OEPP) est principalement signalé dans les états du sud-est. Il a été signalé pour la première fois en 2025 dans le nord-est du pays, dans l'état de New York (SI OEPP 2025/2029). En août 2026, le champignon a été signalé pour la première fois dans le Connecticut sur des sassafras (*Sassafras albidum*) présentant des symptômes dans le comté de Fairfield. Le pathogène a été identifié par des tests au laboratoire (CAES, 2026).

Au Mexique, la présence du champignon pathogène *Phymatotrichopsis omnivora* (Liste A1 de l'OEPP) était connue dans les états de Coahuila et de Durango. Il a récemment été signalé causer des dégâts sur manguier (*Mangifera indica*) dans l'état d'Oaxaca (Ramírez-Orozco *et al.*, 2026).

Au Brésil, le nématode à galles *Meloidogyne enterolobii* (Liste A2 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en juillet 2025 dans l'état de Roraima dans des cultures commerciales de soja (*Glycine max*) (Diniz *et al.*, 2026).

Au Pérou, le chancre des agrumes causé par *Xanthomonas citri* pv. *citri* (Liste A1 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en 2023 dans la région d'Ucayali (province de Coronel Portillo). En 2024, il a également été signalé dans la région voisine de Loreto. En date d'octobre 2026, le pathogène reste limité aux provinces d'Atalia, de Coronel Portillo et de Padre Abad dans la région d'Ucayali, ainsi qu'aux provinces de Maynas et d'Alto Amazonas dans la région de Loreto. Ces deux régions sont loin des principales zones de production d'agrumes destinés à l'exportation (CIPV, 2026).

Le statut phytosanitaire de *Xanthomonas citri* pv. *citri* au Pérou est officiellement déclaré ainsi : **Présent, non largement disséminé et faisant l'objet d'une lutte officielle.**

- **Éradication**

Le tomato mottle mosaic virus (*Tobamovirus maculatusellati*, ToMMV - précédemment sur la Liste d'Alerte de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en Allemagne en 2023 dans une serre (SI OEPP 2023/257). Les plantes infectées, ainsi que les films plastiques et tuyaux d'irrigation, ont été éliminés après un traitement thermique, et la serre a été désinfectée. La serre est désormais utilisée seulement pour cultiver des plantes qui ne sont pas hôtes. Les inspections ultérieures n'ont pas détecté le virus (ONPV d'Allemagne, 2026-10). Le statut phytosanitaire du ToMMV en Allemagne est officiellement déclaré ainsi : **Absent, organisme nuisible éradiqué.**

- **Nouvelles plantes-hôtes**

Batocera rufomaculata (Coleoptera : Cerambycidae) est un foreur polyphage natif d'Asie du Sud-Est. À Oman, il a récemment été observé tuer des baobabs matures (*Adansonia digitata*). Il s'agit d'un nouveau signalement d'hôte pour *B. rufomaculata*. Venter *et al.* (2026) soulignent que cela constituerait une préoccupation majeure si le ravageur est introduit en Afrique, où les baobabs sont des arbres natifs importants.

Rhagoletis pomonella (Diptera : Tephritidae - Liste A1 de l'OEPP) a été signalé sur *Crataegus x cogswellii*, *Crataegus okennonii* et *Crataegus castlegarensis* dans l'état de Washington aux États-Unis. Des larves ont été élevées jusqu'au stade adulte à partir de fruits de *Crataegus* récoltés en 2023 et 2024 (Yee *et al.*, 2026).

- **Réglementation**

La rouille blanche du chrysanthème causée par *Puccinia horiana* (Liste A2 de l'OEPP) n'est plus réglementée en tant qu'organisme de quarantaine aux États-Unis (USDA-APHIS, 2026).

- **Étiologie**

Au Ghana, des prospections ont été menées pour identifier le vecteur de 'Candidatus Phytoplasma palmicola' (l'une des espèces responsables des palm lethal yellowing syndromes - Liste A1 de l'OEPP). Le pathogène a été détecté dans une zone où la maladie est prévalente chez trois espèces d'insectes : *Patara armata* (Hemiptera : Derbidae) et deux espèces non décrites du genre *Dioscrombus* (Hemiptera : Derbidae). Ces espèces sont jugées être des vecteurs potentiels.

- Sources:**
- AusVeg (2026) Monosporascus root rot detection in the Northern Territory. Press release 2026-09-29. <https://ausveg.com.au/article/monosporascus-root-rot-detection-in-the-northern-territory/>
 - Bacak E, Beşkardeş V, Bacak E, Yilmaz E (2026) A new threat to fig trees in Türkiye: the first record of *Aclees taiwanensis* Kôno, 1933 (Coleoptera: Curculionidae). *BiolInvasions Records* 15(1), 89-96, <https://doi.org/10.3391/bir.2026.15.1.09>
 - CAES (2026-09-10) CAES asks residents to scout for laurel wilt on sassafras and spicebush. The Connecticut Agricultural Experiment Station. Press release https://portal.ct.gov/caes/agency-press-release-results-page/2026-9-10?language=en_US
 - Diniz FD, Valadares JI, Mizubuti ES, Santos PS, Santiago TR (2026) First report of the emerging root-knot nematode *Meloidogyne enterolobii* on soybean in Roraima, northern Brazil. *Plant Disease* (early view) <https://doi.org/10.1094/PDIS-06-26-1165-PDN>
 - IPPC website Official Pest Reports. Peru (PER-03/11 of 2026-10-15) Actualización de la condición de *Xanthomonas citri* pv. *citri* en Perú.

<https://www.ippc.int/fr/countries/peru/pestreports/2024/08/actualizacion-de-la-condicion-de-xanthomonas-citri-subsp-citri-en-peru/>

ONPV d'Allemagne (2026-10).

ONPV d'Uruguay (2026-10-14) La DGF recuerda la importancia de comunicar la presencia del barrenador polífago en árboles. <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/dgf-recuerda-importancia-comunicar-presencia-del-barrenador-polifago-arboles>

Ramírez-Orozco XA, López-Juan F, Cruz-Luna AR, Vásquez-López A (2026) Pudrición radicular en mango (*Mangifera indica* L.): aislamiento, histopatología y sensibilidad de *Phymatotrichopsis* a aceites esenciales. *Chilean journal of agricultural & animal sciences* 42(2), 270-282. <https://doi.org/10.29393/CHJAAS42-23PRFR40023r>

Showkat JK, Saeed MR (2026) Occurrence of potato cyst nematode (*Globodera* spp.) as a threat to the potato crop in Yemen. *Arab Journal of Plant Protection* 44(2) 173-182. <https://doi.org/10.22268/AJPP-001384>

Sossah FL, Tettey E, Aidoo OF, Boateng BO, Asante K, Yankey EN (2026) Molecular survey of coconut lethal yellowing phytoplasmas in putative insect vectors in Ghana. *Journal of Applied Entomology* (early view) <https://doi.org/10.1111/jen.70157>.

Theurkar SV (2026) First record of the Oak processionary caterpillar from Jaulake khurd, Pune, part of North-West Ghats (MS), India. *Flora and Fauna* 32(1), 91-94. <https://doi.org/10.33451/florafaua.v32i1pp91-94>

Tiberini A, Donati L, Manglii MA, Vitale S, Luongo L, Tomassoli L. First report of potato mop-top virus on potato (*Solanum tuberosum*) in Italy. *Plant Disease* (early view) <https://doi.org/10.1094/PDIS-05-26-1068-PD>

USDA-APHIS (2026) Notice of decision to deregulate chrysanthemum white rust and the importation of *Chrysanthemum* spp. cuttings, and in vitro plantlets, and synonymous taxa from certain countries into the Continental United States. APHIS-2021-0081. Available at <https://www.regulations.gov/>

Venter SM, Akaak AS, Akaak MM (2026) A new pest threatens Africa's iconic baobab trees. *Global Ecology and Conservation* e04108. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2026.e04108>

Yee WL, Milnes JM, Norrbom AL (2026) Comprehensive lists of suitable host plants of apple maggot, *Rhagoletis pomonella* (Walsh, 1867)(Diptera: Tephritidae), including new host records. *The Pan-Pacific Entomologist* 102(3), 155-190. <https://doi.org/10.3956/2025-102.3.155>

Žežlina I, Murenc A, Devetak M, Rot M, Carlevaris B, Dariž JC (2026) First report of the North American leafminer *Aspilanta oinophylla* (van Nieukerken & Wagner, 2012)(Lepidoptera: Heliozelidae) in Slovenia. *BioInvasions Records* 15(1), 59-65. <https://doi.org/10.3391/bir.2026.15.1.06>

Zhang LJ, Xian WR, Ma YQ (2026) Detection and analysis of occurrence characteristics of major viruses infecting *Prunus avium* L. in Qinghai Province based on ELISA. *Acta Phytopathologica Sinica* 56(4), 554-563 (abst.)

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement, signalement détaillé, nouvelles plantes-hôtes, éradication, étiologie

Codes informatiques : ACEETW, ANTROI, BATCRF, CGRMV0, CRLV00, CVA000, DIOBSP, EUWAWH, HETDPA, HETDRO, LCHV10, MELGMY, PDV000, PHMPOM, PHYP56, PHYPPL, PMTV00, PNRSV0, PTARAR, PUCCHN, RHAGPO, THAUPR, TOMMV0, XANTCI, XYLBFO, BR, CN, DE, GH, IN, IT, MX, OM, PE, SI, TR, US, UY, YE

2026/227 Nouvelles additions aux Listes A1 et A2 de l'OEPP

En septembre 2026, le Conseil de l'OEPP a approuvé les modifications suivantes des Listes A1 et A2 de l'OEPP des organismes nuisibles recommandés pour la réglementation en tant qu'organismes de quarantaine.

Additions à la Liste A1 (organismes nuisibles absents de la région OEPP) :

- *Clavibacter nebraskensis*,
- *Harringtonia lauricola* et son vecteur *Xyleborus glabratus*,
- *Litylenchus crenatae*

Additions à la Liste A2 (organismes nuisibles présents localement dans la région OEPP) :

- *Senecio angulatus* (plante)

Transfert de la Liste A1 à la Liste A2 :

- *Stenocarpella macrospora*

Suppressions de la Liste A1

- Strawberry latent C virus (STLCV)
- *Grosmannia wagneri* [suite à des modifications taxonomiques]

Suppression de la Liste A2

- *Cacoecimorpha pronubana*

Modifications taxonomiques dans la Liste A1 :

- *Grosmannia wagneri* est remplacé par *Leptographium wagneri*, *L. ponderosum* et *L. pseudotsugae*

Pour chaque organisme nuisible, un document d'ARP a été préparé et une fiche informative est en préparation. Ils seront disponibles dans EPPO Global Database (<https://gd.eppo.int>) et dans la Plateforme OEPP sur les analyses du risque phytosanitaire (<https://pra.eppo.int/>).

Source : Secrétariat de l'OEPP (2026-10).

Mots clés supplémentaires : listes OEPP

Codes informatiques : CORBNE, DIPDMC, LEPGWA, LEPGWG, LEPGPS, LITYCR, RAFFLA, STLCV0, TORTPR, LEPGPO, SENAN, XYLBGR, EPPO

2026/228 Mise à jour sur la situation des organismes nuisibles réglementés au Chili

L'ONPV du Chili a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP des modifications du statut phytosanitaire de plusieurs organismes nuisibles réglementés. Les organismes de quarantaine suivants sont déclarés absents du Chili sur la base de prospections officielles:

- *Helicoverpa armigera* (Lepidoptera : Noctuidae - Liste A2 de l'OEPP).
- *Liriomyza trifolii* (Diptera : Agromyzidae - Liste A2 de l'OEPP)
- *Monilinia fructigena* (Ascomycota)
- *Pezothrips kellyanus* (Thysanoptera : Thripidae - précédemment sur la Liste d'Alerte de l'OEPP)
- Plum pox potyvirus (*Potyvirus plumpoxi*, Liste A2 de l'OEPP) : seule la race D est présente au Chili, où elle fait l'objet d'une lutte officielle depuis 1994.
- *Pollinia pollini* (Hemiptera : Asterolecaniidae)
- *Pratylenchus coffeae* (Nematoda)
- *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (Liste A2 de l'OEPP) : seul le biovar 3 est présent au Chili.
- *Thrips palmi* (Thysanoptera : Thripidae - Liste A1 de l'OEPP)

Source : ONPV du Chili (2026-10).

Mots clés supplémentaires : absence

Codes informatiques : HELIAR, LIRITR, MONIFG, PEZTKE, POLNPO, PPV000, PRATCO, PSDMAK, THRIPL, CL

2026/229 L'OEPP recrute un nouveau Directeur-général/une nouvelle Directrice-générale

L'OEPP a lancé la procédure de recrutement d'un nouveau Directeur-général/d'une nouvelle Directrice-générale qui rejoindra le Secrétariat de l'OEPP dès que possible. Le Directeur-général/La Directrice-générale dirigera le Secrétariat de l'OEPP, et mettra en œuvre et développera la stratégie de l'Organisation. La procédure de recrutement et les conditions sont disponibles sur le site Internet de l'OEPP : https://www.eppo.int/ABOUT_EPPO/special_events/director_general

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2026.

Source : Secrétariat de l'OEPP (2026-10).

2026/230 Euphresco recrute un nouveau Coordinateur/une nouvelle Coordinatrice

Le réseau Euphresco recherche un(e) professionnel(le) très organisé(e) et motivé(e) pour occuper le poste de Coordinateur/Coordinatrice d'Euphresco. Le Coordinateur/ la Coordinatrice d'Euphresco dirige le bureau du réseau Euphresco, situé au siège de l'OEPP à Paris, et apporte un soutien administratif au groupe de gestion du réseau. Des informations sur le poste et les modalités de candidature sont disponibles ici : <https://jobs.eppo.int/euphcoord2027>.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 novembre 2026.

Source : Secrétariat de l'OEPP (2026-10).

2026/231 Incursion de *Lycorma delicatula* en Belgique

L'ONPV de Belgique a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP de la première découverte de *Lycorma delicatula* (Hemiptera : Fulgoridae - Liste A1 de l'OEPP) sur son territoire.

Une femelle adulte a été signalée en octobre 2026 sous le volet extérieur d'un système de climatisation d'un avion à l'aéroport de Bruxelles (commune de Halle-Vilvoorde, province du Vlaams-Brabant, région de Vlaams Gewest) et elle a ensuite été capturée. L'identité de l'organisme nuisible a été confirmée par des tests morphologiques. L'avion provenait de l'aéroport international de Washington Dulles (Virginia, États-Unis), un état où la présence de cet insecte est connue. L'ONPV de Belgique suppose que le ravageur s'est retrouvé piégé dans l'avion et a survécu au vol jusqu'en Belgique. Des inspections menées sur des plantes-hôtes à proximité immédiate du lieu de la découverte n'ont pas permis de détecter de signes de présence de *L. delicatula*. Une campagne de sensibilisation est en cours auprès des compagnies aériennes et du personnel aéroportuaire. L'ONPV de Belgique estime qu'il s'agit d'une interception isolée.

Le statut phytosanitaire de *Lycorma delicatula* en Belgique est officiellement déclaré ainsi : **Absent, intercepté seulement, surveillance renforcée et sensibilisation.**

Source : ONPV de Belgique (2026-10).

Photos : *Lycorma delicatula*. <https://gd.eppo.int/taxon/LYCMDE/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement, incursion

Codes informatiques : LYCMDE, BE

2026/232 Découverte d'*Agrilus planipennis* dans la région de Transcarpatie en Ukraine

L'agrile du frêne, *Agrilus planipennis* (Coleoptera : Buprestidae - Liste A2 de l'OEPP), a été détecté pour la première fois en Ukraine en 2019 dans la région de Louhansk (dans l'est de l'Ukraine) et il est désormais présent à Kharkiv et à Kiev (SI OEPP 2019/202, SI 2021/216, SI 2024/007). En juin 2026, le ravageur a été détecté pour la première fois en Hongrie, près de la frontière avec l'Ukraine (SI 2026/185).

Début juillet 2026, l'ONPV d'Ukraine a annoncé la mise en place d'une zone de quarantaine pour *A. planipennis* dans la région de Transcarpatie, pour la première fois dans cette région, dans la ville d'Oujhorod (dans l'ouest de l'Ukraine). Cette zone de quarantaine couvre 0,1 hectare.

Des mesures phytosanitaires officielles sont mises en œuvre.

Source : ONPV d'Ukraine (2026-07) Інформація щодо запровадження карантинного режиму по вузькозлатці ясеневій смарагдовій станом на 03.07.2026. [Information regarding the implementation of a quarantine regime for the emerald ash borer as of July 3, 2026.] <https://dpss.gov.ua/npas/informatsiia-shchodo-zaprovadzhennia-karantynnoho-rezhymu-po-vuzkozlattsi-iasenevii-smarahdovii-stanom-na-03072026> .

Department of the State Food and Consumer Service in Volyn region (2026-07-10) Ясенева смараглова златка - небезпечний карантинний шкідник, що загрожує лісам та зеленим насадженням України [The emerald ash borer is a dangerous quarantine pest that threatens Ukraine's forests and green spaces] Press release (2026-07-10)

<https://voldpss.gov.ua/viewNews/yaseneva-smarahdova-zlatka-nebezpechnyi-karantynnyi/>

Photos : *Agrilus planipennis*. <https://gd.eppo.int/taxon/AGRLPL/photos>

Mots clés supplémentaires : signalement détaillé

Codes informatiques : AGRLPL, UA

2026/233 La carte dynamique de l'OEPP sur la dissémination de l'agrile du frêne, *Agrilus planipennis*, est désormais en ligne

L'agrile du frêne, *Agrilus planipennis* (Liste A2 de l'OEPP), est un ravageur extrêmement destructeur qui endommage et tue les frênes. En 2022, l'OEPP a mis en place un réseau d'experts chargés de la surveillance, du suivi et de la lutte contre l'agrile du frêne afin d'aider les pays membres à se préparer à la gestion de ce ravageur (SI OEPP 2023/081).

L'OEPP a élaboré un outil, *DynaMaps*, qui permet de produire des cartes interactives et dynamiques sur la présence du ravageur par région et par année. Cet outil sera mis à jour à mesure que de nouvelles données seront disponibles. Le *DynaMaps* d'*A. planipennis* est désormais disponible en ligne. Il contient actuellement environ 4 600 signalements d'*A. planipennis* provenant de sa zone d'indigénat et des zones envahies. Ces signalements proviennent de publications scientifiques évaluées par des pairs, de signalements des ONPV et de bases de données ouvertes, et ont été vérifiés par les experts du réseau et du Panel OEPP sur les organismes de quarantaine forestiers. Les ONPV des pays membres de l'OEPP ont été invités à valider les observations pertinentes.

Une carte en accès libre qui contient les observations validées dans la région OEPP est disponible ici : <https://dynamap.eppo.int/public/01a120f9-f213-73a6-995b-845068879de0>

Les ONPV des pays membres de l'OEPP ont été invités à consulter une carte élargie qui comprend aussi des signalements non validés. L'accès à cette carte est réservé aux ONPV des pays membres de l'OEPP.

Source : Secrétariat de l'OEPP (2026-10).

Network of experts working on surveillance, monitoring, and control of the Emerald ash borer, *Agrilus planipennis*
https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/agrilus_planipennis_network

Photos : *Agrilus planipennis*. <https://gd.eppo.int/taxon/AGRLPL/photos>

Mots clés supplémentaires : carte, répartition géographique

Codes informatiques : AGRLPL

2026/234 Incursion de *Corythucha arcuata* au Bélarus

La punaise réticulée du chêne, *Corythucha arcuata* (Hemiptera : Tingidae - Liste A1 de l'UEEA), est native d'Amérique du Nord. Elle a été trouvée pour la première fois dans la région OEPP en Italie en 2000, et elle s'est ensuite disséminée dans de nombreux pays de la région OEPP (SI OEPP 2001/057, SI 2020/169, SI 2025/255). *C. arcuata* est réglementée en tant qu'organisme de quarantaine au Bélarus et dans l'Union économique eurasiatique.

Un article scientifique récent mentionne le premier signalement de *C. arcuata* au Bélarus en 2025. Deux mâles ont été observés sur les feuilles d'un chêne (*Quercus robur*) en août

2025 dans la région de Brest (district de Kobryn, village de Verkhalesye). Des prospections supplémentaires ont été menées par les auteurs dans la région de Brest, mais aucun autre spécimen n'a été trouvé. Les spécimens trouvés ont été détruits et l'arbre infesté a été traité avec un insecticide biologique contenant des champignons entomopathogènes.

L'ONPV du Bélarus a informé le Secrétariat de l'OEPP que des prospections officielles dans les peuplements forestiers du village de Verkhalesye et du district forestier de Verkhalesye, dans le district de Kobryn, ont été menées conjointement avec les auteurs de l'article en 2025 et 2026. *C. arcuata* n'a pas été trouvé.

Le statut phytosanitaire de *Corythucha arcuata* au Bélarus est officiellement déclaré ainsi : **Absent**.

Source : ONPV du Bélarus (2026-10).

Sinchuk A, Lukashuk A, Naiman O (2026) First record of *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) in Belarus. *EPPO Bulletin* 56(2), 289-293.

Photos : *Corythucha arcuata*. <https://gd.eppo.int/taxon/CRTHAR/photos>

Mots clés supplémentaires : incursion, absence

Codes informatiques : CRTHAR, BY

2026/235 Première observation de *Keiferia lycopersicella* en Arménie

Dans la région OEPP, la mineuse de la tomate *Keiferia lycopersicella* (Lepidoptera : Gelechiidae, Liste A1 de l'OEPP) n'avait été signalée qu'une seule fois, en Italie (SI OEPP 2010/211), mais ne s'était pas établie. Un article scientifique indique sa présence en Arménie.

Des prospections ont été menées entre juin et septembre 2024 dans plusieurs régions d'Arménie à l'aide de pièges à phéromone contenant une phéromone synthétisée en Arménie. Les pièges ont été placés dans des parcelles, dans 8 des 10 régions d'Arménie : Aragatsotn, Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lori, Syunik et Tavush. Le ravageur a été signalé dans les régions d'Ararat, d'Armavir, de Kotayk et de Tavush. Les dégâts sur feuilles et fruits étaient plus importants dans les cultures de tomate (*Solanum lycopersicum*) et d'aubergine (*Solanum melongena*) que dans les cultures de pomme de terre (*Solanum tuberosum*) et de poivron (*Capsicum* sp.).

K. lycopersicella n'est pas un organisme de quarantaine pour l'Arménie, mais *Phthorimaea absoluta* (syn. *Tuta absoluta*, Lepidoptera : Gelechiidae - Liste A2 de l'OEPP), qui lui ressemble et qui est également un ravageur des solanacées, est un organisme de quarantaine à répartition limitée en Arménie.

Les auteurs estiment qu'il s'agit du premier signalement de *K. lycopersicella* en Arménie. Il convient de noter que l'article n'explique pas comment le ravageur a été identifié ni depuis combien d'années il pourrait être présent en Arménie.

La situation de *Keiferia lycopersicella* en Arménie peut être décrite ainsi : **Présent, non largement disséminé et ne faisant pas l'objet d'une lutte officielle**.

Source : Hobosyan NG, Balyan KV, Movsisyan LA, Hovsepyan VS, Sargsyan HB, Pogosyan HR, Harutyunyan HR, Manvelyan AA, Ghazaryan MH, Asatryan SS, Terlemezyan HL (2025) novel synthetic strategy and field testing tomato pinworm pheromone in Armenia.

Chemistry & Biodiversity 22(7), e202403455.

<https://doi.org/10.1002/cbdv.202403455>

Photos : *Keiferia lycopersicella*. <https://gd.eppo.int/taxon/GNORLY/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : GNORLY, AM

2026/236 Nouvelles incursions de *Popillia japonica* en Autriche

Popillia japonica (Coleoptera : Scarabaeidae - Liste A2 de l'OEPP) a été signalé pour la première fois en Autriche en juillet 2025 dans un jardin de la commune d'Hörbranz (Land du Vorarlberg) et l'ONPV a estimé qu'il s'agissait d'un individu isolé, entré en tant que contaminant (SI OEPP 2025/213).

L'ONPV d'Autriche a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP de nouvelles découvertes de *P. japonica* sur son territoire :

- **Steiermark (juillet 2026)**

Deux *P. japonica* ont été détectés en juillet 2026 dans un piège sur une aire d'autoroute près de la ville de Graz, sur un axe routier menant à des zones infestées en Italie. Des plantes-hôtes potentielles se trouvent aux abords de cette aire. Cinq autres pièges ont été installés, et aucun autre coléoptère n'a été capturé depuis, ni trouvé au cours d'inspections visuelles.

- **Tirol (août 2026)**

Un adulte mâle a été trouvé dans un piège proche d'une aire d'autoroute de la commune d'Ebbs. Il s'agit de la première découverte au Tirol. Des pièges avaient été placés sur la rive autrichienne de l'Inn suite à des observations en Bavière, sur la rive allemande, au cours des années précédentes mais, avant cette découverte, aucune observation n'avait eu lieu sur la rive autrichienne.

- **Vorarlberg (août 2026)**

Un adulte a été trouvé fin août 2026 dans un piège sur une aire d'autoroute de la commune d'Hohenems. Cinq autres pièges ont été installés dans un rayon d'1 km autour du site de la découverte. Le Service régional de protection des végétaux de Saint-Gall, en Suisse, a été informé, car une partie de la zone de prospection se trouve en Suisse.

L'ONPV d'Autriche estime que toutes ces observations concernent des contaminants. Dans tous les cas, des prospections intensives sont menées et des pièges supplémentaires ont été installés. Des actions de sensibilisation sont mises en œuvre.

Source : ONPV d'Autriche (2026-08, 2026-09).

Photos : *Popillia japonica*. <https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/photos>

Mots clés supplémentaires : incursion

Codes informatiques : POPIJA, AT

2026/237 Mise à jour sur la situation d'*Anoplophora glabripennis* en Allemagne

En Allemagne, le premier foyer d'*Anoplophora glabripennis* (Coleoptera : Cerambycidae - Liste A2 de l'OEPP) a été détecté en Bavière en 2004 (SI OEPP 2004/072). D'autres foyers

ont été détectés depuis en Bavaria, ainsi qu'au Baden Württemberg (désormais éradiqué), Nordrhein-Westfalen et Sachsen-Anhalt. Des mesures d'éradication ont été appliquées dans tous les cas.

L'ONPV d'Allemagne a récemment fourni au Secrétariat de l'OEPP une mise à jour sur la situation du foyer du district de Rothensee, dans la ville de Magdeburg, en Sachsen-Anhalt. Le foyer avait été détecté en 2014 (SI OEPP 2014/184, SI 2021/058), et d'autres arbres infestés ont été trouvés dans la zone délimitée entre 2020 et 2022 (SI 2023/008).

Des pièges placés dans la zone délimitée ont capturé un mâle adulte d'*A. glabripennis* en août 2023 et une femelle adulte en août 2024, ce qui a entraîné l'élargissement de la zone délimitée (à 50,48 km²). En août 2025, trois femelles adultes ont été capturées dans un piège. Des prospections supplémentaires ont permis de détecter 2 *Acer campestre* présentant des symptômes, qui ont été immédiatement abattus. L'infestation a été confirmée par la découverte d'une larve vivante, d'une larve morte et d'un adulte. Toutes les plantes-hôtes dans un rayon de 100 m ont été abattues et inspectées, et la zone délimitée a été étendue à 52,72 km².

En août 2026, une femelle adulte a été capturée dans un piège de la zone délimitée, à 500 m de la zone d'abattage de 2025. Cela porte à 25 (6 mâles et 19 femelles) le nombre d'adultes capturés dans des pièges depuis 2015, répartis entre 22 pièges. Les prospections et les mesures d'éradication se poursuivent conformément au Règlement d'exécution 2025/1952/UE.

Le statut phytosanitaire d'*Anoplophora glabripennis* en Allemagne est officiellement déclaré ainsi : **Transitoire, donnant lieu à une action phytosanitaire, en cours d'éradication**

Source : ONPV d'Allemagne (2026-09).

Règlement d'exécution (UE) 2025/1952 de la Commission du 29 septembre 2025 relatif à des mesures visant à prévenir l'établissement et la propagation d'*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) sur le territoire de l'Union et à des mesures d'éradication et d'enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/893. JO L, 2025/1952, 3.12.2025, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1952/oj

Photos : *Anoplophora glabripennis*. <https://gd.eppo.int/taxon/ANOLGL/photos>

Mots clés supplémentaires : signalement détaillé

Codes informatiques : ANOLGL, DE

2026/238 *Eotetranychus lewisi* à nouveau trouvé en Suisse

En Suisse, l'acarien *Eotetranychus lewisi* (Acari : Tetranychidae - Annexes de l'UE) a été trouvé pour la première fois en octobre 2021 sur *Euphorbia pulcherrima* dans une serre à Zürich, et a ensuite été éradiqué (SI OEPP 2021/241, SI 2023/106).

Fin juillet 2026, un foyer d'*E. lewisi* a été signalé par un professionnel dans le canton de Zürich, sur sept *E. pulcherrima* faisant partie d'un lot en provenance d'un état membre de l'UE. Aucune plante présentant des symptômes n'a été détectée dans les deux autres serres appartenant à ce professionnel. Des mesures d'éradication sont mises en œuvre, y compris la destruction des plantes présentant des symptômes et l'application de produits phytosanitaires sur tous les *E. pulcherrima* asymptomatiques présents dans les installations

du professionnel. Une nouvelle inspection est prévue, après le traitement, à l'issue de laquelle une décision sera prise sur d'éventuelles mesures phytosanitaires supplémentaires.

Le statut phytosanitaire d'*Eotetranychus lewisi* en Suisse est officiellement déclaré ainsi : **Présent, en cours d'éradication.**

Source : ONPV de Suisse (2026-07).

Photos : *Eotetranychus lewisi*. <https://gd.eppo.int/taxon/EOTELE/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : EOTELE, CH

2026/239 Premier signalement de la cochenille *Acutaspis paulista* en Espagne et dans la région OEPP

L'ONPV d'Espagne a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP du premier signalement de la cochenille à bouclier *Acutaspis paulista* (Hemiptera : Diaspididae) sur son territoire. Il s'agit également du premier signalement dans la région OEPP.

A. paulista a été détecté dans la commune d'Ullà (comté de Baix Empordà, province de Girona, Catalogne) en mai 2025 dans une oliveraie (*Olea europaea*) au cours d'un suivi sur la cochenille *Parlatoria oleae* (Hemiptera : Diaspididae). *A. paulista* a également été observé dans des parcs et des jardins sur olivier, *Euonymus japonicus* et *Ligustrum* sp.

A. paulista est présent en Argentine et au Brésil, et est un organisme de quarantaine en cours d'éradication au Chili depuis 2023. Il s'agit d'une espèce polyphage. Ses hôtes comprennent des cultures agricoles importantes, telles que l'olivier, l'avocatier (*Persea americana*) et les *Citrus* spp. En Argentine et au Brésil, les dégâts principaux concernent l'olivier, car la cochenille peut attaquer les fruits, en plus des feuilles.

Une évaluation rapide du risque phytosanitaire réalisée en Espagne a conclu que l'espèce peut très probablement s'établir dans les zones qui ont un climat méditerranéen. En date de septembre 2026, *A. paulista* avait été signalée dans 15 communes voisines dans le comté de Baix Empordà. L'ONPV mène actuellement un suivi pour évaluer la présence de ce ravageur.

Source : ONPV d'Espagne (2026-09).

Photos : *Acutaspis paulista*. <https://gd.eppo.int/taxon/MELAPA/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : MELAPA, ES

2026/240 Premier signalement de *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa* au Luxembourg

L'ONPV du Luxembourg a récemment informé le Secrétariat de l'OEPP de la première détection de *Xylella fastidiosa* (Liste A2 de l'OEPP) sur son territoire.

Le 12 octobre 2026, *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* a été détectée dans des échantillons de plants de *Vitis vinifera* provenant de trois localités des communes de Merttert et de Grevenmacher (canton de Grevenmacher), dans la région viticole luxembourgeoise de la Moselle. L'organisme nuisible a été identifié par un test PCR en temps réel.

Des mesures d'éradication sont mises en œuvre conformément au Règlement d'exécution (UE) n°2020/1201. Des zones infestées de 50 m autour de chaque plant infecté, portant la superficie totale de la zone infestée à 2,35 ha, et des zones tampons de 2,5 km autour de chaque zone infestée ont été établies. Des échantillons ont été prélevés sur des plantes se trouvant aux alentours des vignobles touchés. Les plantes infectées ou suspectes, y compris les plantes asymptomatiques, seront détruites. Une surveillance renforcée sera menée dans les zones tampons des cantons de Grevenmacher (communes de Merttert, Manternach, Grevenmacher, Biwer et Wormeldange) et d'Echternach (commune de Rosport-Mompach). Des mesures sont mises en œuvre pour lutter contre les insectes vecteurs, et le mouvement de plantes-hôtes hors des zones délimitées est interdit. Les autorités allemandes ont été contactées car les zones tampons s'étendent au-delà de la frontière avec l'Allemagne, et des mesures similaires sont désormais mises en œuvre par l'ONPV d'Allemagne.

Le statut phytosanitaire de *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa* au Luxembourg est officiellement déclaré ainsi : **Présent, en cours d'éradication.**

Source : ONPV du Luxembourg (2026-10).

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (2026-10) Détection de la bactérie dans le vignoble mosellan luxembourgeois. Accessed at:
<https://agriculture.public.lu/de/aktuelles/2026/oktober/xylella.html>

Une carte de la zone infestée est disponible ici : <https://agriculture.public.lu/dam-assets/aktuelles/2026/oktober/annexe-1-carte-des-zones-dlimites-zones-infestes-et-tampons.pdf>

Photos : *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*. <https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFF/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : XYLEFA, XYLEFF, LU

2026/241 Premier signalement de *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* en Calabria, en Italie

En Italie, *Xylella fastidiosa* (Liste A2 de l'OEPP), ensuite identifiée comme *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*, a été détectée pour la première fois en 2013 dans la région Puglia (SI OEPP 2013/184), où elle fait l'objet de mesures d'enrayement depuis 2018 (SI 2022/111).

X. fastidiosa subsp. *pauca* a récemment été signalée pour la première fois dans la région Calabria. Des inspections officielles ont été menées suite au signalement par un particulier d'un cas soupçonné être *X. fastidiosa* sur un olivier (*Olea europaea*) d'un jardin privé de la commune de Taurianova. Cinq oliviers ont fait l'objet d'un échantillonnage en juillet et 30

en août 2026. Sept oliviers ont donné un résultat positif pour le pathogène (tests moléculaires).

Une zone infectée de 50 m a été établie autour des arbres infectés dans la commune de Taurianova, ainsi qu'une zone tampon de 2,5 km, qui s'étend sur les communes de Cittanova et de Terranova Sappo Minulio. Des mesures d'éradication sont mises en œuvre.

Le statut phytosanitaire de *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca* en Italie est officiellement déclaré ainsi : **Présent**.

Source : ONPV d'Italie (2026-08).

Regione Calabria Giunta Regionale (01-09-2026) Individuazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* in agro di Taurianova (RC) e istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4, capo III, del Reg. UE 2020/1201. Accessible at: <https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2026/09/DDS-n.-14746-del-01-09-2026.pdf>

Regione Calabria Giunta Regionale (08-09-2026) Individuazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* in agro di Taurianova (RC) e istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4, capo III, del Reg. UE 2020/1201 - AGGIORNAMENTO DDS n. 14746 del 01/09/2026. Accessible at: https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2026/09/Atto_numero_15068_del_08-09-2026.pdf

Photos : *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*. <https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFP/photos>

Mots clés supplémentaires : signalement détaillé

Codes informatiques : XYLEFP, IT

2026/242 Premier signalement de *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* aux Pays-Bas

Dans le cadre de prospections officielles, 180 parcelles de haricots ont fait l'objet de prospections en 2025 et 2026 aux Pays-Bas. *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Liste A2 de l'OEPP), agent causal de la brûlure bactérienne du haricot, a été détecté en 2025 dans deux parcelles de haricot (*Phaseolus vulgaris*), et en 2026 dans trois parcelles de *P. vulgaris* et une parcelle de fève (*Vicia faba*). Ces découvertes ont toutes eu lieu dans la province de Zeeland. Des plantes présentant des symptômes de flétrissement et des taches nécrotiques sur les feuilles ont été observées. L'échantillonnage et les tests ont confirmé la présence de *X. citri* pv. *fuscans* dans tous les échantillons.

L'origine de ces infections n'est pas claire. On ne sait pas si la bactérie peut survivre dans ces parcelles. Dans l'UE, *X. citri* pv. *fuscans* est réglementé en tant qu'organisme réglementé non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de *Phaseolus vulgaris*. Par conséquent, aucune mesure supplémentaire n'est prise aux Pays-Bas suite à ces découvertes.

Des mesures sont en vigueur pour les semences (destinées à la plantation) de *Phaseolus vulgaris*, conformément aux exigences de l'UE stipulées dans le Règlement (UE) 2019/2072.

Le statut phytosanitaire de *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* aux Pays-Bas est officiellement déclaré ainsi : **Présent, quelques cas**.

Source : ONPV des Pays-Bas (2026-09).

Photos : *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. <https://gd.eppo.int/taxon/XANTFF/photos>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement

Codes informatiques : XANTFF, NL

2026/243 Premier signalement de ‘*Candidatus Phytoplasma katsepyensis*’, une nouvelle espèce impliquée dans la maladie ‘palm lethal yellowing’ à Madagascar

La maladie du jaunissement léthal du cocotier (également connue sous les noms ‘palm lethal yellowing disease’, PLYP, ou ‘palm lethal yellowing type syndromes’, Liste A1 de l’OEPP) est associée à plusieurs espèces de phytoplasmes selon les régions où elle a été observée.

À Madagascar, des cocotiers (*Cocos nucifera*) isolés présentant un flétrissement très sévère ont été observés en 2016 dans trois localités (Katsepy, Antsohyhi et Ambaritsatrana) sur les côtes occidentale et septentrionale de l’île. Pilet *et al.* ont d’abord identifié l’agent causal comme étant une espèce de phytoplasme étroitement apparentée au Tanzanian lethal decline phytoplasma (‘*Candidatus Phytoplasma cocostanzaniae*’), puis il a été jugé être une espèce distincte, qui a été nommée ‘*Candidatus Phytoplasma katsepyensis*’.

Des prospections ont été menées en 2024-2025 afin d’identifier les vecteurs de ‘*Ca. Phytoplasma katsepyensis*’ à Madagascar. Le phytoplasme a été détecté sur des *Bismarckia nobilis* asymptomatiques. Cette espèce de palmier est native de Madagascar. Trois espèces de *Nesomyndus* (Hemiptera : Cixiidae) étaient associées aux palmiers et ont été testées en tant que vecteurs potentiels. Le phytoplasme a été détecté dans les glandes salivaires de *N. maculatus* et les auteurs concluent qu’il s’agit d’un vecteur compétent de ‘*Ca. Phytoplasma katsepyensis*’.

Source : Bahder BW, Ratsimbazafy MR, Randretsiferana SA, Hasinjaka RH, Bloch M, Lane J, Helmick EE, Swale DR, Rakotomalala MR, Pilet F (2026) Detection of Palm Lethal Yellowing Phytoplasma in the salivary glands of *Nesomyndus maculatus* and asymptomatic Bismarck palms from Madagascar. *Phytopathology* 116(9), 1414-1423

Pilet F, Rakotoariosa E, Rakotomalala M, Sisterson S, Razakamanana HN, Ravemiafara L (2021) First report of strains related to the phytoplasma associated with Tanzanian lethal decline on *Cocos nucifera* on the western coast of Madagascar. *Plant Disease* 105, 4146. <https://doi.org/10.1094/PDIS-03-21-0623-PDN>

Fiche informative : Palm lethal yellowing type syndromes.
<https://gd.eppo.int/taxon/PHY56/datasheet>

Mots clés supplémentaires : organisme nuisible nouveau, taxonomie, nouveau signalement, étiologie

Codes informatiques : PHY56, PHYPKA, NESMMA, MG

2026/244 Premier signalement de ‘*Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus*’ sur maïs

La γ-protéobactérie ‘*Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus*’ a d’abord été associée au syndrome des basses richesses (précédemment sur la Liste d’Alerte de l’OEPP), maladie émergente de la betterave sucrière (*Beta vulgaris*) dans la région OEPP (SI OEPP 2025/074). La bactérie est transmise par *Pentastiridius leporinus* (Hemiptera : Cixiidae). Elle a récemment été trouvée sur d’autres cultures : pomme de terre (SI OEPP 2023/209, SI 2025/073) et oignon (SI 2025/072).

À l’été 2025, ‘*Ca. Arsenophonus phytopathogenicus*’ a été détecté pour la première fois par des tests moléculaires sur des plants de maïs (*Zea mays*) en Allemagne. Les plants

présentaient un dessèchement prématuré en plaques, une coloration anormale rougeâtre des feuilles et des nervures centrales, des épis mal remplis ou avortés, et des grains déformés. Les échantillons avaient été prélevés en Baden-Württemberg, Hessen et Rheinland-Pfalz.

On peut noter que *P. leporinus* est un vecteur connu de la maladie 'maize redness' ('*Candidatus Phytoplasma solani*' - précédemment sur la Liste d'Alerte de l'OEPP).

Source : Benaouda S, Witczak N, Kaufmann T, Löffler D, Pfitzner H, Dettweiler A, Lee K-Z, Lang C (2026) First report of '*Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus*' in maize (*Zea mays* L.) in Germany. *Plant Disease* (early view) <https://doi.org/10.1094/PDIS-07-26-1454-PDN>.

Mots clés supplémentaires : nouvelle plante-hôte

Codes informatiques : ARSEPH, DE

2026/245 *Pleurotus citrinopileatus*, champignon envahissant échappé de culture

Le pleurote jaune (*Pleurotus citrinopileatus*) est un champignon xylophage comestible cultivé tant par des professionnels que par des amateurs. *P. citrinopileatus* est natif de l'Extrême-Orient russe et d'Asie de l'Est. Il a été signalé pour la première fois aux États-Unis en 2012, où il est désormais présent dans 25 états, et il existe des signalements dans plusieurs pays de la région OEPP.

Une évaluation du risque a été réalisée par le Secrétariat britannique des espèces non natives ('GB Non-native Species Secretariat') suite à la découverte de *P. citrinopileatus* dans deux localités, à Liverpool (région du North West England) et Barnsley (région de Yorkshire and the Humber). L'ARP conclut que la probabilité d'entrée et d'établissement au Royaume-Uni est très élevée, et que la dissémination serait très rapide. L'impact économique direct devrait être mineur, mais l'impact environnemental serait important, car *P. citrinopileatus* pourrait entrer en compétition avec des champignons saprotrophes natifs, comme cela a été observé aux États-Unis.

Un article récent de Stallman & Allen (2026) souligne le risque lié à l'importation intentionnelle de champignons envahissants cultivés à des fins alimentaires ou médicinales. Les auteurs recommandent d'interdire la vente d'espèces envahissantes connues, telles que *P. citrinopileatus*, dans les zones où elles ne sont pas établies, et de fournir des instructions pour l'élimination en toute sécurité des kits commerciaux de culture de champignon à la maison.

Source : GB Non-native Species Rapid Risk Assessment for *Pleurotus citrinopileatus* (Singer) (golden oyster mushroom). <https://www.nonnativespecies.org/assets/Uploads/Pleurotus-citrinopileatus-RRA-final.pdf>

Stallman JK, Allen JL (2026) What should we do about cultivated mushroom invasions? *Studies in Fungi* 11, e010 <https://doi.org/10.48130/sif-0026-0008>

Mots clés supplémentaires : nouveau signalement, espèce envahissante, biodiversité

Codes informatiques : PLEUCI, GB

2026/246 Éradication de *Meloidogyne enterolobii* au Portugal

Au Portugal, *Meloidogyne enterolobii* (Liste A2 de l'OEPP) a été trouvé pour la première fois sur 2 plantes ornementales (*Physalis peruviana*) dans un jardin privé de la commune

d'Arazede (district de Coimbra, région Centro) en octobre 2017 (SI OEPP 2018/120). 915 échantillons ont été collectés dans l'ensemble du Portugal, y compris à proximité du foyer, au cours des prospections officielles menées entre 2019 et 2021 sur *M. chitwoodi* et *M. fallax*, et des prospections officielles menées entre 2022 et 2025 sur *M. enterolobii*. Tous les échantillons ont donné un résultat négatif pour *M. enterolobii*. Sur la base de ces résultats et en l'absence de toute nouvelle découverte depuis le foyer initial, l'ONPV du Portugal estime que *M. enterolobii* n'est plus présent au Portugal.

Le statut phytosanitaire de *Meloidogyne enterolobii* au Portugal est officiellement déclaré ainsi : **Absent, organisme nuisible éradiqué.**

Source : ONPV du Portugal (2026-10).

Photos : *Meloidogyne enterolobii*. <https://gd.eppo.int/taxon/MELGMY/photos>

Mots clés supplémentaires : éradication, absence

Codes informatiques : MELGMY, PT

2026/247 Potentiel de lutte biologique préventive contre *Aleurocanthus woglumi* (Liste A1 de l'OEPP)

Pourquoi

La lutte biologique préventive peut être envisagée contre les organismes des végétaux avant que ceux-ci ne s'établissent et ne se disséminent largement dans un pays à risque. Des agents de lutte biologique potentiels peuvent être identifiés avant l'arrivée de l'organisme nuisible et des études être réalisées pour déterminer si leur utilisation est sûre et s'ils conviennent pour la région OEPP. *Aleurocanthus woglumi* (Hemiptera : Aleyrodidae - Liste A1 de l'OEPP) est un ravageur des agrumes mais on le trouve également sur une vaste gamme de cultures, principalement des arbres fruitiers (Nguyen, 2008 ; EPPO, 2026). Natif d'Asie du Sud-Est, *A. woglumi* est un ravageur dans d'autres pays d'Asie, d'Amérique du Nord (par ex. Florida), d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi qu'en Afrique du Sud. Dans la région OEPP, *A. woglumi* a une répartition très limitée, seulement dans l'ouest de la Géorgie (régions d'Adjara, de Guria et de Samegrelo), où il est présent à faible prévalence. *A. woglumi* peut avoir un impact économique important sur les agrumes, car il produit un miellat sucré abondant qui recouvre les feuilles et les fruits, rendant ces derniers impropres à la commercialisation. Dans certaines régions productrices d'agrumes, la réduction de la production de fruits peut atteindre jusqu'à 80 %.

Deux parasitoïdes hyménoptères, *Encarsia perplexa* (Hymenoptera : Aphelinidae) et *Amitus hesperidum* (Hymenoptera : Platygasteridae), sont des agents de lutte biologique classique efficaces dans plusieurs régions du monde (Milonas & Giakoumaki, 2025). Disposer d'un agent de lutte biologique prêt à l'emploi en cas d'apparition d'un foyer d'*A. woglumi* pourrait aider à limiter la dissémination du ravageur. Cela est particulièrement important pour les pays producteurs d'agrumes du bassin méditerranéen.

Biologie et écologie

Encarsia perplexa est un parasitoïde hétéronome arrhénotoque, chez lequel les œufs non fécondés produisent des mâles et les œufs fécondés, des femelles. Les femelles ont une durée de vie comprise entre quatre et six semaines. À température constante de 24°C, le développement de l'œuf à l'adulte nécessite 30 à 35 jours. Le parasitoïde peut attaquer n'importe quel stade nymphal, mais a une préférence pour les 2ème et 3ème stades (Milonas & Giakoumaki, 2025).

Les adultes d'*Amitus hesperidum* vivent 2 à 6 jours et les femelles peuvent pondre de 60 à 70 œufs, principalement sur les nymphes de premier stade.

Alimentation et efficacité

Utilisés ensemble, *E. perplexa* et *A. hesperidum* se sont révélés très efficaces pour lutter contre *A. woglumi*. Les taux de parasitisme d'*A. hesperidum* sur *A. woglumi* peuvent atteindre 90 %. Dans le cadre d'un programme de lutte biologique classique utilisant *A. hesperidum* pour lutter contre *A. woglumi* à Trinidad, les populations d'*A. woglumi* ont diminué de plus de 98 % sur tous les sites, tandis que le taux de parasitisme a augmenté jusqu'à 60-90 % (White *et al.*, 2005).

En raison de son cycle de développement plus long, *E. perplexa* est jugé être un agent de lutte biologique efficace même lorsque le niveau de population d'*A. woglumi* est faible.

Sécurité

Les deux parasitoïdes présentent un bilan excellent en terme de sécurité dans les endroits où ils ont été lâchés en tant qu'agents de lutte biologique classique. Quatre ans après le

lâcher d'*E. perplexa* et d'*A. hesperidum* en Dominique, aucun impact sur des espèces non ciblées n'avait été signalé (Lopez *et al.*, 2009).

Historique d'utilisation en tant qu'agent de lutte biologique

Amitus hesperidum et *E. perplexa* ont tous deux une longue histoire d'utilisation pour la lutte biologique classique contre *A. woglumi*. Ils ont été utilisés pour la première fois au Mexique en 1949-1950, puis à Guam (1952), aux États-Unis (Texas en 1974-1975, Florida en 1976-1979, Hawaii en 1998), en Dominique (1996-1997) et à Trinidad. *Encarsia perplexa* a été introduit au Salvador en 1978.

Compatibilité climatique

Akrivou *et al.* (2021) ont montré qu'*A. woglumi* présente un risque pour toutes les zones de production d'agrumes de la région OEPP, tant sous les scénarios climatiques actuels que futurs. L'hôte étant capable de s'établir, il est probable qu'*E. perplexa* et *A. hesperidum* présentent également un fort potentiel d'établissement dans la région OEPP. Milonas & Giakoumaki (2025), citant d'autres auteurs, notent que les deux parasitoïdes se sont adaptés aux conditions climatiques dans lesquelles ils ont été lâchés pour la lutte biologique classique. *E. perplexa* est jugé moins sensible qu'*A. hesperidum* à la sécheresse et aux températures élevées.

Recommandations du Panel OEPP/OILB sur les agents de lutte biologique

L'étude de Milonas & Giakoumaki (2025) conclut qu'un programme de lutte biologique préventive contre *A. woglumi* dans la région OEPP est réalisable. Le Panel OEPP/OILB sur les agents de lutte biologique recommande aux pays pour lesquels *A. woglumi* présente un risque de former un consortium pour lancer des recherches sur un programme de lutte biologique préventive contre *A. woglumi* à l'aide d'*E. perplexa* et d'*A. hesperidum*.

Source : Akrivou A, Georgopoulou I, Papachristos DP, Milonas PG, Kriticos DJ (2021) Potential global distribution of *Aleurocanthus woglumi* considering climate change and irrigation. *PLoS ONE* 16(12), e0261626.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261626>

EPPO (2026) *Aleurocanthus woglumi*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation. <https://gd.eppo.int> (accessed 2026-09-01)

Lopez VF, Kairo MTK, Pollard GV, Pierre C, Commodore N & Dominique D (2009) Post-release survey to assess impact and potential host range expansion by *Amitus hesperidum* and *Encarsia perplexa*, two parasitoids introduced for the biological control of the citrus blackfly, *Aleurocanthus woglumi* in Dominica. *BioControl* 54(4), 497-503.

Milonas PG, Giakoumaki MV (2025) Is pre-emptive classical biological control feasible for *Aleurocanthus woglumi* in Europe? *Biological Control* 206, doi.org/10.1016/j.biocontrol.2025.105795

Nguyen R (2008) *Aleurocanthus woglumi* (citrus blackfly). CABI Compendium 4137, <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.4137>

Thompson CR, Cornell JA & Sailerl RI (1987) Interactions of parasites and a hyperparasite in biological control of citrus blackfly, *Aleurocanthus woglumi* (Homoptera: Aleyrodidae), in Florida. *Environmental Entomology* 16(1), 140-144.

Mots clés supplémentaires : agents de lutte biologique

Codes informatiques : ALECWO, AMIUHE, ENCAPP

2026/248 Évaluation d'augmentoria en plein champ pour *Ganaspis kimorum*

Drosophila suzukii (Diptera : Drosophilidae - Liste A2 de l'OEPP) est une mouche frugivore native d'Asie de l'Est. Elle s'est disséminée dans de nombreuses régions du monde, y compris dans d'autres parties de l'Asie, aux Amériques, en Afrique et dans la région OEPP. Les augmentoria portatifs sont des cages à insectes dans lesquelles sont placés des fruits infestés par un ravageur, et qui sont dotées d'une entrée à mailles sélectives qui retient le ravageur mais permet aux parasitoïdes de sortir. L'efficacité de ces cages pour augmenter la présence de l'agent de lutte biologique *Ganaspis kimorum* (Hymenoptera : Figitidae) a été étudiée en 2024-2025 dans de petites exploitations fruitières de l'ouest de l'Oregon, aux États-Unis. Des augmentoria contenant des myrtilles (*Vaccinium corymbosum*) infestées par *D. suzukii* (environ 400 œufs) ont été placés dans des parcelles et réapprovisionnées chaque semaine en fruits infestés. Ces parcelles de traitement ont été comparées à des parcelles témoin sans augmentorium. Des fruits ont été échantillonnés à 0, 5 et 10 m des augmentoria, puis conservés au laboratoire pour évaluer l'émergence des insectes. En 2024, 15 341 adultes de *D. suzukii* et 1563 hyménoptères parasitoïdes ont été collectés pour 520 fruits au total. En 2025, 13 050 adultes de *D. suzukii*, mais seulement 407 hyménoptères parasitoïdes ont été collectés pour 469 fruits. Pour les deux années, les augmentoria n'étaient pas associés à une augmentation du parasitisme ni à une diminution de l'infestation par le ravageur dans le rayon d'étude de 10 m. Plusieurs facteurs ont pu limiter l'efficacité des augmentoria, y compris la température plus élevée dans les cages et l'attraction des fourmis.

Source : McDonald NS, Lee JC (2026) Field evaluation of portable augmentorium cages for increasing parasitoid presence to manage *Drosophila suzukii*. *Biological Control* 219 <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2026.106076>

Mots clés supplémentaires : agents de lutte biologique

Codes informatiques : DROSSU, GANAKI, US

2026/249 Lutte biologique contre *Cryptostegia madagascariensis* au Brésil

Cryptostegia madagascariensis (Apocynaceae) est une liane native de Madagascar. Elle est cultivée en tant que plante ornementale de jardin dans différents pays à travers le monde. Il s'agit d'une plante exotique envahissante en Australie, au Brésil, aux Caraïbes, aux États-Unis (Florida et Hawaii) et en Afrique du Sud. Le genre *Cryptostegia* comprend deux espèces, et l'espèce apparentée *Cryptostegia grandiflora* a fait l'objet d'un programme de lutte biologique classique couronné de succès en Australie. *C. madagascariensis* peut avoir un impact négatif dans les zones envahies, avec des effets sur la biodiversité et les services écosystémiques. La rouille *Maravalia cryptostegiae* (Chaetoniaceae) a été évaluée dans la zone d'indigénat de *C. madagascariensis* en tant qu'agent de lutte biologique potentiel contre la plante au Brésil. Des prospections menées à Madagascar ont permis de collecter 22 souches de la rouille. La compatibilité et la virulence de chaque souche vis-à-vis des biotypes brésiliens de *C. madagascariensis* ont été évaluées. Des analyses moléculaires des populations de la plante dans la zone d'indigénat et dans la zone d'introduction ont été réalisées afin de confirmer l'identité de l'espèce envahissante au Brésil et de déterminer l'origine, dans la zone d'indigénat, de la population brésilienne. L'étude biogéographique moléculaire montre que la population brésilienne est homogène et étroitement apparentée à une population isolée de *C. madagascariensis* du nord de Madagascar. Une souche de la rouille prélevée dans cette zone de Madagascar s'est avérée être spécifique et causer des dégâts sur les populations brésiliennes de *C. madagascariensis*.

Source : Pollard KM, Kurose D, Tilling AE, Gaskin JF, Devlin PF, Evans HC, Seier MK (2026) Finding the best match - use of the rust fungus *Maravalia cryptostegiae* for control of *Cryptostegia madagascariensis* in Brazil. *Biological Control* 215, <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2026.106004>

Seier MK, Rapini A, Pollard KM, Barreto RW, Evans HC (2023) Tracing the origins and tracking the movements of invasive rubber vines (*Cryptostegia* spp., Apocynaceae). *NeoBiota* 89, 95-133. <https://doi.org/10.3897/neobiota.89.109180>

Mots clés supplémentaires : agents de lutte biologique

Codes informatiques : CVRMA, MARVCR, BR

2026/250 Les milieux de culture en tant que filières d'introduction de plantes exotiques

Le transport de milieux de culture, en tant que tel ou en association avec des végétaux destinés à la plantation, peut constituer une filière pour les organismes nuisibles. En 2025, des inspections ont été menées dans 20 installations d'importation des Pays-Bas. Des plantes en pot ont été inspectées et des plantes soupçonnées de les contaminer ont été prélevées pour l'analyse. En outre, des échantillons de tourbe de coco ('coco peat') provenant d'un lot contaminé ont été prélevés et analysés afin de détecter la présence de plantes exotiques. La tourbe de coco est souvent utilisée en tant que milieu de culture des plantes en pot ; elle est également importée en tant que telle et peut constituer une filière d'introduction de plantes non natives. La prospection a permis d'intercepter plusieurs espèces qui sont régulièrement détectées en tant que contaminants des plantes en pot, notamment *Alternanthera philoxeroides* (Amaranthaceae, Liste A2 de l'OEPP), *Humulus scandens* (Cannabaceae, Liste A2 de l'OEPP) et *Lygodium japonicum* (Schizaeaceae, Liste A1 de l'OEPP). Deux espèces, *Microstegium vimineum* (Poaceae, Liste A2 de l'OEPP) et *Broussonetia papyrifera* (Moraceae, Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP), sont signalées pour la première fois en tant que contaminants de plantes en pot. *Parthenium hysterophorus* (Asteraceae, Liste A2 de l'OEPP) était un contaminant de la tourbe de coco provenant du Sri Lanka. Ces résultats démontrent les risques liés aux milieux de culture contaminés et soulignent la nécessité de donner une priorité à l'inspection de ces filières souvent négligées.

Source : Van Valkenburg JLCH, Beyer JL, Piet LF (2026) *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér. ex Vent., *Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus and *Parthenium hysterophorus* L. imported into the Netherlands via potted ornamentals or their coco peat substrate. *EPPO Bulletin* (early view). <https://doi.org/10.1111/epp.70130>

Mots clés supplémentaires : plante exotique envahissante, **Codes informatiques :** ALRPH, BRNPA, HUMJA, LYFJA, MCGVI, filière PTNHY, NL

2026/251 Coûts économiques mondiaux des plantes envahissantes

InvaCost est une base de données dynamique et une source de données mondiales sur les coûts financiers liés aux espèces envahissantes. InvaCost a été utilisée pour évaluer les impacts économiques mondiaux des plantes envahissantes. Les types de coûts comprenaient l'impact économique sur différents secteurs (par ex. agriculture, pêche, sylviculture, etc.), les coûts liés aux dégâts et les coûts de gestion. Entre 1960 et 2022, les coûts documentés s'élevaient à 361,8 milliards d'USD, ce qui représente une estimation de référence prudente de l'impact des plantes envahissantes à l'échelle mondiale. La plupart des coûts étaient liés aux espèces végétales terrestres (266 milliards d'USD), suivies des espèces aquatiques (6,8 milliards d'USD) et des espèces semi-aquatiques (1,5 milliard d'USD). Les espèces aux coûts économiques les plus élevés comprenaient : *Tamarix* spp. (Tamaricaceae), *Opuntia* spp. (Cactaceae), *Ambrosia artemisiifolia* (Asteraceae, Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP), *Euphorbia esula* (Euphorbiaceae) et *Pontederia crassipes* (Pontederiaceae, Liste A2 de l'OEPP). Ces espèces ont engendré des coûts s'élevant à plusieurs milliards d'USD. Dans la base de données InvaCost, les données sur les coûts proviennent surtout d'Amérique du Nord (265,0 milliards d'USD pour les plantes envahissantes). Les coûts pour l'Europe s'élevaient à 11,4 milliards d'USD. Il est intéressant de noter que le coût des dégâts était trois fois plus élevé que le montant consacré à la gestion des plantes envahissantes.

Source : Mugnai M, Balzani P, Soto I, Ahmed DA, Cuthbert R, Tarkan AS, Tordoni E, Dolan E, Carneiro L, Brundu G, Catford J, Essl F, Fernandez RD, Fujinuma J, Heringer G, Hulme

PE, Kolomiiets G, Kourantidou M, Lazzaro L, Martin-Fores I, Misuri A, Novoa A, Nuñez M, Pergl J, Pyšek P, Siccardi E, van Bodegom P, Vilà M, Webber B, Xavier R, Zheng S, Courchamp F (2026) Global economic costs of invasive plants. *Research Square* (Pre-Print) DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-11016003/v1>

InvaCost database (v4.1; <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12668570>)

Mots clés supplémentaires : plantes exotiques
envahissantes, impact économique

Codes informatiques : 10PUG, 1TAAG, AMBEL, EICCR

2026/252 Les plantes coupées d'*Impatiens glandulifera* peuvent produire des graines viables

Impatiens glandulifera (Balsaminaceae, Liste des plantes exotiques envahissantes de l'OEPP) est native des contreforts de l'Himalaya (Inde et Pakistan). Il s'agit d'une plante exotique envahissante dans la région OEPP, où elle est largement disséminée. *I. glandulifera* envahit généralement les prairies humides et les habitats riverains, et peut avoir un impact négatif sur la biodiversité native et les services écosystémiques. Les méthodes de lutte contre *I. glandulifera* comprennent le fauchage et l'arrachage manuel, qui peuvent être efficaces en raison de la faiblesse du système racinaire. Les plantes arrachées à la main et celles qui ont été fauchées peuvent être laissées sur le sol. Un essai a été mené près de Kraków (Pologne) pour évaluer si des plantes coupées au stade de la floraison peuvent survivre assez longtemps pour produire des graines viables. En mai, des plantules collectées sur plusieurs sites ont été plantées dans une parcelle expérimentale. Fin août, 20 individus en fleur ont été coupés et laissés sur place, et 20 autres ont été laissés intacts. Des graines ont été récoltées sur toutes les plantes en septembre et leur viabilité a été testée. Les plantes coupées ont survécu environ trois semaines ; elles ont produit des fleurs, qui ont produit des graines viables. Les plantes intactes ont produit davantage de fleurs, mais la quantité de graines viables n'était pas plus importante que pour les plantes coupées. L'étude montre que des *I. glandulifera* coupées peuvent encore produire des graines viables. Par conséquent, les méthodes de lutte manuelle, pour être efficaces, doivent être mises en œuvre plus tôt dans la saison, avant la floraison de la population, ou les plantes coupées doivent être ramassées et éliminées de manière adéquate.

Source : Najberek K, Myśliwy M, Rewicz A, Solarz W (2026) Plant cuttings of invasive alien *Impatiens glandulifera* Royle develop flowers and produce viable seeds. *Scientific Reports* 16, 9371, <https://doi.org/10.1038/s41598-025-33573-8>

Photos : *Impatiens glandulifera*. <https://gd.eppo.int/taxon/IPAGL/photos>

Mots clés supplémentaires : plantes exotiques
envahissantes

Codes informatiques : IPAGL, PL

2026/253 Espèces de plantes exotiques au Kazakhstan

Le premier inventaire complet et vérifié des plantes vasculaires exotiques du Kazakhstan, établi à partir de la littérature, d'herbiers, d'observations sur le terrain et de bases de données en ligne (par. ex. iNaturalist) a été publié. La flore exotique du Kazakhstan comprend 263 taxons représentant 181 genres et 54 familles. 141 des taxons (53,6 %) sont naturalisés, 120 sont occasionnels et le statut d'établissement des 2 derniers n'est pas déterminé. Les familles les plus représentées sont les Asteraceae (47 taxons), suivies par : Poaceae (30), Brassicaceae (20), Fabaceae (20), Amaranthaceae (15) et Lamiaceae (14). Les taxons exotiques présents au Kazakhstan proviennent de différentes parties du monde, la

région méditerranéenne représentant le groupe biogéographique le plus important (39,9 %), suivie de l'Amérique du Nord (22,8 %). De nombreux taxons (75 taxons, 28,5 %) sont associés à des habitats modifiés par l'homme. Vingt taxons sont envahissants selon une évaluation utilisant la classification de l'impact environnemental des taxons exotiques ('EICAT') (Tableau 1). Dix-sept de ces 20 taxons ont des impacts modérés et trois ont des impacts majeurs.

Tableau 1. Vingt espèces de plantes exotiques envahissantes au Kazakhstan (impact basé sur la classification de l'impact environnemental des taxons exotiques - EICAT)

Espèces	Famille	Origine	Impact
<i>Acer negundo</i>	Sapindaceae	Asie	Modéré
<i>Ailanthus altissima</i> *	Simaroubaceae	Asie	Modéré
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> **	Asteraceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Ambrosia psilostachya</i> *	Asteraceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Ambrosia trifida</i> **	Asteraceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Centaurea diffusa</i>	Asteraceae	Méditerranée	Majeur
<i>Cuscuta campestris</i>	Convolvulaceae	Amérique du Nord	Majeur
<i>Cuscuta chinensis</i>	Convolvulaceae	Asie	Modéré
<i>Elodea canadensis</i>	Hydrocharitaceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Erigeron annuus</i>	Asteraceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Erigeron canadensis</i>	Asteraceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Euonymus europaeus</i>	Celastraceae	Europe	Modéré
<i>Fraxinus excelsior</i>	Oleaceae	Europe	Modéré
<i>Hordeum jubatum</i>	Poaceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Iva xanthiifolia</i>	Asteraceae	Amérique du Nord	Majeur
<i>Orobancha aegyptiaca</i>	Orobanchaceae	Méditerranée	Modéré
<i>Pilosella aurantiaca</i>	Asteraceae	Europe	Modéré
<i>Senecio viscosus</i>	Asteraceae	Europe	Modéré
<i>Xanthium orientale</i>	Asteraceae	Amérique du Nord	Modéré
<i>Xanthium spinosum</i>	Asteraceae	Amérique du Nord	Modéré

* Liste OEPP des Plantes exotiques envahissantes

** Liste A2 de l'OEPP

Source : Alibekov D, Kubentayev S, Nobis M, Chepinoga V, Ishmuratova M, Sennikov AN (2026) Alien Vascular Plants of Kazakhstan: The first national checklist and spatial distribution patterns. *Plants* 15, 2934, <https://doi.org/10.3390/plants15192934>

Mots clés supplémentaires : plantes exotiques envahissantes, nouveaux signalements

Codes informatiques : ACRNE, AILAL, AMBEL, AMBPS, AMBTR, CENDI, CVCCA, CVCCH, ELDCA, ERIAN, ERICA, EUOEU, FRXEX, HORJU, IVAXA, ORAAE, HIEAU, SENVI, XANOR, XANSP